


IX. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP



SZEGED, 2014. NOVEMBER 7-8.

SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
6722 SZEGED, ADY TÉR 10.



PROGRAM

Erőteljes HbA_{1c} csökkentés 2-es típusú diabéteszben, ha metforminnal nem érhető el a HbA_{1c}<7% célérték!^{1,2}

Rövidített alkalmazási előírás Velmetia® 50 mg/1000 mg filmtabletta 56x

ATC kód: A10BF07. **Mínimális és mennyiségi összetétel:** 50 mg szitagliptint, megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát és 1000 mg metformin-hidroklorid tablettalettel. **Terápiás javallatok:** Glükémis kontroll javítására 2-es típusú diabétesz betegeknek, akiknél a diéta és testmozgás mellett adott, maximálisan tolerálható adagú metformin nem biztosít megfelelő vércukorszintet vagy akiket már szitagliptin és metformin (M) kombinációval kezelnek. Szulfonilurea (SU) kombinációban (hámas kombinációs terápia) olyan betegek számára, akiknél M+SU maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorszintet. PPAR α -agonistákkal (pl. tiazolidindionokkal) hámas kombinációban olyan betegek számára, akiknél M+PPAR α -agonista maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorszintet. A Velmetia ezen kívül diéta és testmozgás mellett a glükémis kontroll javítására javított inzulinnal kombinációban adva (hámas kombinációs terápia), olyan betegek számára, akiknél az inzulinnal állandósított és a metformin önmagában nem biztosít megfelelő vércukorszintet. **Adagolás és alkalmazás:** Egyszeri, étkezés után >1 Tableta 1-2 évesek között. (A szitagliptin max. napi dózisa napi 100 mg.) SU-val való kombináció esetén hipoglükémiás veszélye miatt a SU dózisának, inzulinnal való kombináció esetén az inzulín adagjának csökkentése jöhet szóba. Minden betegnél folytatnia kell az egyetemes napi szétválasztott étkezést, táplálkozásukat a csökkentett mennyiségű étellel jó diétával kell. **Különleges betegségekre:** Enyhé vesekárosodásban szenvedő betegeknek az adagot nem szükséges módosítani. Közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban nem alkalmazható. **Idősor:** 75 év feletti korúknak ellenőrizni kell az inzulín igényét. **Gyermekgyógyászati:** biztonságosságát és hatásidegát igazolték és 18 év feletti fiatalok között gyűjtött megfigyelések szerint nem szitagliptin. **Hírcikk:** nem rendelkezésre álló adatok. **Előnyök/hátrányok:** Türelmetlen, diabétesz ketoacidózis, diabétesz kóma, mellékhatás állapota, közepesen súlyos vesekárosodás, a vesefunkció befolyásoló olyan állapotok, mint a ketoacidózis, súlyos fertőzés, sokk és idegrendszeri károsodások alkalmazása olyan állapot vagy betegség, mely követi hypoglikémiát, illetve kezelést meycardialis infarktus, sokk, myocardositis, akut alkoholos intoxikáció, alkoholtartalmú szedálás. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** **Paracetamol:** gyógyszeres terápia esetén a Velmetia és más paracetamollal gyanúsított gyógyszerek szedését abba kell hagyni. **Tavaszi oltások:** gyógyszert a Velmetia alkalmazással abba kell hagyni, és a betegezt oltással köztudottan eltildítani kell szedésétől. **Szűzesség, terhesség és szoptatás:** terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését, a terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését, a terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését, a terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését. **Főbb mellékhatások (>1%, kombináció):** fejfájás, (szitagliptin/metformin-hidroklorid) hipoglükémiás, hányinger, flatulencia, hányás, (szitagliptin/metformin-hidroklorid) hipoglükémiás (SU, PPAR α -agonista, inzulín), székrekedés (SU), periphysis ödéma (PPAR α -agonista). **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációra (4.1.), az adagolásra és alkalmazásra (4.2.), ill. a figyelmeztetésekre (4.4.)**

www.ema.europa.eu EU/ET/017/08/456/010
 A forgalomba hozatal engedély kiosztásának dátuma: 2008. július 16. 22/05/2014 Velmetia-EMA/H/C/000862-WS/0559
 Szöveg ellenőrzés: 2014.07.23.

Árinformáció Velmetia® 50/1000 mg filmtabletta 56x: Fogy. Ár: 11.205 Ft; Eml. tén: 7.899 Ft; (Egy 70%); Eü. emelt tér. díj: 3.416 Ft

Terméknél átvizsgálással és eredményességvel kapcsolatos információkért forduljon orvosátogató kollégájához, illetve kezelő tájékoztató az Országos Egészségpótlószaki Pénztár honlapján: www.oep.hu

A Velmetia® a Merck & Co., INC., Whitehouse Station, NJ, USA bejegyzett védjegye.
 Copyright © MERCK & Co., INC., Whitehouse Station, NJ., USA 2009. Minden jog fenntartva.

A mellékletben leírtak nem 7. és 8. cikk szerinti előírások, hanem a termék leírásának részét képezik.

Hatékony, innovatív terápia a 2-es típusú diabétesz kezelésében³



Rövidített alkalmazási előírás XeleVIA® 100 mg filmtabletta 28x

ATC kód: A10BF07. **Hatóanyag:** 100 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) tablettalettel. **Terápiás javallatok:** monoterápiában: ha a diéta és a testmozgás önmagában történő alkalmazása mellett a kontroll nem megfelelő, és metformin (MET) ellenjavallt vagy intolerancia miatt nem alkalmazható; **kettős kezelésben:** MET-nél kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül MET alkalmazása a glükémis kontroll nem megfelelő vagy szulfonilurea (SU) kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül a SU nem biztosít megfelelő vércukorszintet, beállítás; **hámas orális terápia:** SU-val és MET-nel kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett az ezzel a két szerrel végzett együttes kezelés nem biztosít megfelelő vércukorszintet, beállítás vagy PPAR α -agonistával (SU, PPAR α -agonista) hámas kombinációban adva, amelyen a PPAR α -agonista alkalmazása helyettesíti, és ha a diéta és a testmozgás, valamint ezeket a szeret tartalmazó kettős terápia nem biztosítja a glükémis kontrollt nem megfelelő; **inzulinnal kombinációban:** MET-nél vagy a MET-vel és a diéta és a testmozgás, és az inzulinnal állandósított és a metformin önmagában nem biztosít megfelelő vércukorszintet. **Adagolás:** 1x100 mg tableta SU-val javított inzulinnal való kombináció esetén hipoglükémiás veszélye miatt a SU ill. az inzulín dózisának csökkentése jöhet szóba. **Előnyök/hátrányok:** Türelmetlen, diabétesz ketoacidózis, diabétesz kóma, mellékhatás állapota, közepesen súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek számára a Velmetia szedését abba kell hagyni, és a betegezt oltással köztudottan eltildítani kell szedésétől. **Szűzesség, terhesség és szoptatás:** terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését, a terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését, a terhesség alatt nem szabad alkalmazni a Velmetia szedését. **Főbb mellékhatások (>1%, kombináció):** fejfájás, (szitagliptin/metformin-hidroklorid) hipoglükémiás, hányinger, flatulencia, hányás, (szitagliptin/metformin-hidroklorid) hipoglükémiás (SU, PPAR α -agonista, inzulín), székrekedés (SU), periphysis ödéma (PPAR α -agonista, inzulín), székrekedés (SU), periphysis ödéma (PPAR α -agonista, inzulín). **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációra (4.1.), az adagolásra és alkalmazásra (4.2.), ill. a figyelmeztetésekre (4.4.)**

www.ema.europa.eu EU/ET/017/08/282/014
 A forgalomba hozatal engedély kiosztásának dátuma: 2007. március 21. 22/05/2014 XeleVIA-EMA/H/C/000762-WS/0558
 Szöveg ellenőrzés: 2014.07.23.

Árinformáció XELEVIA® 100 mg filmtabletta 28x: Fogy. Ár: 10.493 Ft; Eml. tén: 7.345 Ft; (Egy 70%); Eü. emelt tér. díj: 3.148 Ft

Referencia: 1. Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone. Diabetes Care 2006; 29: 2638-2643. 2. VELMETIA (sitagliptin + metformin, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu). 3. XELEVIA (sitagliptin + metformin, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu)

Terméknél átvizsgálással és eredményességvel kapcsolatos információkért forduljon orvosátogató kollégájához, illetve kezelő tájékoztató az Országos Egészségpótlószaki Pénztár honlapján: www.oep.hu

A XeleVIA® a Merck & Co., INC., Whitehouse Station, NJ, USA bejegyzett védjegye.
 Copyright © MERCK & Co., INC., Whitehouse Station, NJ., USA 2009. Minden jog fenntartva.

További információ: Egys. Gyógyszer-gyártó Zrt. marketing@szitagliptin1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 803-21-22, fax: 803-24-599, e-mail: marketing@egys.hu honlap: www.egys.hu
 Lezárás dátuma: 2014.09.24.

Kezdje a napot **MÉRY**-vel!

Az első és egyetlen magyar nyelvű
vércukorszintmérő tölthető akkumulátorral

MÉRY PILLE



Magyar nyelvű menürendszer
Magyar fejlesztés
Tölthető akkumulátor

Di-Care Zrt.,
1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
www.mery.hu, www.dicare.hu

MÉRY tesztsíkkal használható!
www.cukorbetegvagyok.hu

A MÉRY PILLE vércukorszintmérő készülék gyógyászati segédeszköz.
A kockázatokról olvassa el a kezelési útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Tisztelt Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika tisztelettel üdvözli Önt és munkatársait a IX. Szegedi Diabétesz Nap rendezvényen, mely a hagyományokhoz híven ismét a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában kerül megrendezésre.

Időpont: 2014. november 7 – 8.

**Helyszín
(továbbképzés és vacsora):** T.I.K., 6722 Szeged, Ady tér 10.

Kongresszusi iroda:



Stand-Art Ügynökség Kft.
Horváth Judit irodavezető
6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt. 2.
Felső Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.
Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331
E-mail: judit@stand-art.hu

Hivatalos megnyitás tervezett időpontja: 2014. november 7., 13:00

Hivatalos zárás tervezett időpontja: 2014. november 8., 14:00

A rendezvény házi orvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxológus, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási program. A konferencia **mindkét napján** részt vevő, és a tesztet helyesen kitöltő orvosok 22 akkreditációs pontot kapnak.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A IX. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10. • 2014. november 7-8.

KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

Stand-Art Ügynökség Kft.

Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2., Felső Tisza-part 31-34.

Számlázási ill. postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf. 17.

Adószám: 13970831-2-06

Bankszámlaszám: AXA Bank 17000019-11679912

Tel: +36/62-317 445 • Fax: +36/62-661 331

E-mail: info@stand-art.hu

Honlap: www.stand-art.hu

REGISZTRÁCIÓVAL ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

Stand-Art Ügynökség Kft. • Horváth Judit irodavezető

6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2., Felső Tisza-part 31-34.

Tel: +36/62-317 445 • Fax: +36/62-661 331

E-mail: judit@stand-art.hu

TUDOMÁNYOS PROGRAM:

Dr. Holzinger Gábor

Tel.: +36/30-998 6160

E-mail: holzinger@t-online.hu

KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

November 7.: 12⁰⁰ – 17⁰⁰

November 8.: 8⁰⁰ – 13⁰⁰

REGISZTRÁCIÓS IRODA TELEFONSZÁMA:

+36/30-619 7348

● REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

A regisztrációs díj minden résztvevő számára 10.000,- Ft, mely tartalmazza az étkezések (az ebédek, az esti fogadás és a kávészünetek, értékük összesen 4.900,-Ft/fő) költségeit és a 27% ÁFA összegét.

● SZÁLLÁSFOGLALÁS:

A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val értendők, és tartalmazzák a 18% ÁFÁ-t, de NEM TARTALMAZZÁK A PARKOLÁSI KÖLTSÉGEKET! A szálláshelyekről bővebb információ a www stand-art.hu/SZDN9/szallas oldalon található.

Hotel Novotel****

Szeged, Maros u. 1.

Hotel Korona***

Szeged, Petőfi sgt. 4.

● PARKOLÁS:

A szálláshelyek a vendégek számára zárt parkolási lehetőséget biztosítanak. A Novotel vendégeinek a szálloda előtt 1.500,- Ft/nap, a garázsban 3.100,- Ft/nap parkolási díjat kell fizetni, a Korona vendégeinek (max. 11 autó számára) a parkolás ingyenes. Szeged belvárosában, ill. a konferencia helyszínén a T.I.K. ajándékboltban előre vásárolt jeggyel lehet parkolni. SMS-ben Telenor, Vodafone és T-Mobile előfizetőknek van lehetőségük parkolási díjat fizetni, információ: <http://www.szepark.hu>.

A T.I.K. a **kék** parkolási zónában helyezkedik el.

A parkolójeggyel nem rendelkező gépjárműveket megbüntetik és elszállíthatják!

Mobil fizetés módja:

1. Küldjön SMS-t (előfizetésétől függően) a 06/20-4444 660, 06/70-4444 660 vagy 06/30-4444 660-as telefonszámra a gépjármű rendszámának és a megvásárolni kívánt parkolószelvény első két betűjének megadásával.

2. A sikeres parkolószelvény vásárlásról szintén SMS-ben kap tájékoztatást, mely tartalmazza a megadott rendszámot, a jegy típusát és a jegy érvényességét a különböző zónákban.

Tehát az elküldendő SMS üzenet például egy napi parkolószelvény vásárlásakor:

ABC123,na

Szelvények jelölése	SMS kód	Egységár	Zöld zóna	Sárga zóna	Kék zóna
egész	eg	550 Ft	1 óra	2 óra	4 óra
felező	fe	330 Ft	1/2 óra	1 óra	2 óra
negyed	ne	255 Ft	1/4 óra	1/2 óra	1 óra
napi	na	1 640 Ft	A teljes parkolási időszakban		

Letölthető dokumentumok, szálláshely információ
www.stand-art.hu/SZDN9

Minden résztvevőnek hasznos és kellemes időtöltést kívánunk!

Dr. Holzinger Gábor
szakvezető főorvos

SZTE Szent-Györgyi Albert
 Klinikai Központ
 I.sz. Belgyógyászati Klinika
 Belgyógyászat-Diabetológia
 Tel.: +36/30-998 6160
 E-mail: holzinger@t-online.hu

Prof. Dr. Ábrahám György
tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE Szent-Györgyi Albert
 Klinikai Központ
 I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója

PROGRAM

2014. november 7., péntek

- 12:00 – 12.50** **Regisztráció**
- 12.50 – 13.00** **Megnyitó**
- 13:00 – 13:30** **Servier Hungaria Kft. workshop**

Moderátor: Dr. Holzinger Gábor

Dr. Keresztes Katalin: ADVANCE-ON - 10 év eredményeinek margójára

- 13:30 – 14:15** **77 Elektronika Kft. szimpózium**

Vércukormérésben ITTHON vagyunk!**Üléselnök:** Prof. Dr. Ábrahám György

Dr. Holzinger Gábor: A beteg-együttműködés és a cukorbeteg gondozás

Dr. Takács Róbert: Telemedicina a diabetológiában – új lehetőségek vagy feladatok?

- 14:15 – 15:45** **Takeda Pharma Kft. tudományos szimpózium**

A DPP-4 gátlás újabb dimenziói – fókuszban az alogliptin család**Üléselnökök:** Prof. Dr. Jermendy György, Dr. Ofner Péter

Dr. Oroszlán Tamás: A DPP-4 gátlók hatékonysága – Vannak különbségek?

Prof. Dr. Jermendy György: A DPP-4 gátlókkal kapcsolatos CV végpontú vizsgálatok áttekintése – Mit tudunk jelenleg?

Dr. Fülöp Tibor: Az alogliptin szerepe az igen nagy kockázatú T2DM betegek kezelésében – Mit üzen az EXAMINE vizsgálat?

- 15:45 – 16.00** **Kávészünet**

16:00 – 17:00 AstraZeneca Kft. tudományos szimpózium

Engedjen a cukrából!

Üléselnök: Prof. Dr. Ábrahám György

Prof. Dr. Ábrahám György: Bevezető gondolatok

Dr. Gyimesi András: Amikor a kevesebb több – a heti egyszeri exenatid kezelés előnyei

Dr. Takács Róbert: Az SGLT2-gátlás elméleti háttere

Dr. Nyirati Gábor: Engedjen a cukrából! A dapagliflozin a klinikai vizsgálatok tükrében

17:00 – 18:00 Egis Gyógyszergyár Zrt. tudományos szimpózium

A 2-es típusú diabétesz kezelése speciális esetekben

Üléselnök: Prof. Dr. Ábrahám György

Prof. Dr. Ábrahám György: A 2-es típusú diabeteszes betegek vérnyomás-csökkentő terápiájának főbb szempontjai

Dr. Holzinger Gábor: Vércukorcsökkentés szitagliptin - metformin kombinációval halmozott társbetegségek esetén idős korban

Dr. Gyimesi András: A hipoglikémia kardiovaszkuláris veszélyei. A szitagliptin biztonságossága

18:00 – 19:00 Sanofi-Aventis Zrt. tudományos szimpózium

BOT és prandiális GLP-1 kezelés a mindennapi gyakorlatban

Üléselnök: Dr. Holzinger Gábor

Dr. Takács Róbert: A BOT kezelés előnyei

Dr. Oroszlán Tamás: Lixiszenatid hatása a glykaemiás kontrollra, a gyomor-ürülésre és a biztonságossági paraméterekre

Dr. Holzinger Gábor: Lixiszenatid alkalmazása a 2-es típusú diabétesz kezelésben

19:00 Vacsora (SZTE Tanulmányi és Információs Központ, Átrium)

2014. november 8., szombat

TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSOK

Moderátor: Dr. Holzinger Gábor

9:00 – 11:30

Prof. Dr. Winkler Gábor: A WHO vs. IADPSG kritériumok szerinti GDM szűrés tapasztalatai

Dr. Baranyi Éva: A fiatalkori cukorbetegség változó arculata: jó és rossz hírek

Dr. Körner Anna: A modern technológia alkalmazása a gyermekdiabetológiai gondozásban

Dr. Gyimesi András: Fizikai aktivitás diabéteszben - evidenciák és gyakorlati problémák

Prof. Dr. Jermendy György: Biohasonló inzulinok a láthatáron

11:30 – 12:00 Kávészünet

12:00 – 14:00

Prof. Dr. Halmos Tamás: A metabolikus szindróma újabban felismert kapcsolatai

Dr. Hidvégi Tibor: Diabetes és depresszió

Prof. Dr. Pécsvárady Zsolt: Diabéteszes láb az angiológus szemszögéből

Prof. Dr. Facskó Andrea: A diabéteszes betegek és a glaukoma (A tyúk, vagy a tojás)

14:00 Tesztírás, zárás, ebéd

JEGYZETEK


JEGYZETEK

A page of lined paper for taking notes, featuring horizontal dotted lines on a light beige background.

A DIABÉTESZ NAP KIEMELT TÁMOGATÓI



SANOFI 

AstraZeneca 



77 Elektronika Kft.



A DIABÉTESZ NAP TOVÁBBI TÁMOGATÓI

TWINMED
ORVOSI RENDSZEREK KFT



BERLIN-CHEMIE
MENARINI



Lilly



Boehringer
Ingelheim



 NOVARTIS




RICHTER GEDEON



Mofetta^{KFT.}



#konferenciák 2015



IX. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTTÉGE

EGER, 2015. október 1-3.

www.stand-art.hu/KDH2015

FIATAL DIABETOLÓGUSOK FÓRUMA

2015. november 12-14.

www.stand-art.hu/FDF2015



X. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP

SZEGED, 2015. november 20-21.

www.stand-art.hu/SZDN10

Vércukormérésben ITTHON vagyunk!



A Dcont® termékcsalád
a Magyar Értéktárban
nyilvántartott **nemzeti érték**ké vált.



Dcont® TREND



Köszönjük támogatását,
továbbra is ajánlja
betegeinek a
VALÓDI MAGYAR
vércukormérőt!



Dcont® IDEÁL



A Magyar Diabetés Társaság Vezetősége
elkötelezett a hazai innováció mellett, ezért a
Társaság pártfogolja a Dcont termékcsaládot.



77 Elektronika Kft.

