



MDT 2018



A MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXVI. KONGRESSZUSA

SZEGED, 2018. ÁPRILIS 19-22.

PROGRAM



GLP-1 RA: glükagon-szerű-peptid-1 receptor agonista

A GYÓGYSZER NEVE: Victoza® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat 6 mg liraglutidot* tartalmaz. Egy előretöltött injekciós toll 3 ml-ben 18 mg liraglutidot tartalmaz.

*humán glükagon-szerű peptid-1 (GLP-1) analóg, rekombináns DNS-technológiával *Saccharomyces cerevisiae*-ben előállítva.



GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat, pH = 8,15.

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<http://www.ema.europa.eu> → Find medicine → Human medicines → V → Victoza® → Product information → HU = magyar** → GO

* Lapozni a jobb alsó sarokban lehet. ** Kiválasztás az első lenyíló listában.

Megjegyzés: a QR kód a termék kezdőbetűje szerinti lista első oldalára mutat.

FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Victoza® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A Victoza® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (2x3 ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 29 831 Ft. Tb-támogatás: 20 882 Ft, térítési díj: 8 949 Ft Eü 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 2018. március 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszerszertörzs.



Novo Nordisk Hungária Kft.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169
www.novonordisk.hu

Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com



Victoza® – Az egyetlen GLP-1 RA, amely megelőzi a kardiovaszkuláris események kialakulását^{1,2}

ÚJ!



Kardiovaszkuláris események
megelőzése^{1,2}



Jelentős hatékonyság HbA_{1c}
csökkentésben³⁻⁹



Jelentős mértékű fogyás³⁻⁹

**Biztosítsa betegeinek a szükséges glikémiás
és kardiovaszkuláris előnyöket a világszerte
leggyakrabban alkalmazott GLP-1 RA
terápiával!^{2,10}**

Referenciák: **1.** Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al; the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375(4):311-322. **2.** Victoza® alkalmazási előírás (szöveggellenőrzés dátuma: 2017. július) Bagsvaerd, Denmark: Novo Nordisk A/S; 2017. **3.** Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. *Int J Clin Pract.* 2011;65(4):397-407. **4.** Nauck M, Rizzo M, Johnson A, Bosch-Traberg H, Madsen J, Cariou B. Once-daily liraglutide versus lixisenatide as add-on to metformin in type 2 diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. *Diabetes Care.* 2016;39(9):1501-1509. **5.** Buse JB, Nauck M, Forst T, et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. *Lancet.* 2013;38(9861):117-124. **6.** Pratley RE, Nauck MA, Barnett AH, et al. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomised, open-label, multicenter, non-inferiority phase 3 study. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2014;2(4):289-297. **7.** Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, et al; for the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes; a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). *Lancet.* 2009;374(9683):39-47. **8.** Dungan KM, Provedano ST, Forst T, et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet.* 2014;384(9951):1349-1357. **9.** Pratley RE, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. *Lancet.* 2010;375(9724):1447-1456. **10.** Internal calculations based on IMS MIDAS database, April 2017.

A Victoza® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2018, Novo Nordisk A/S

Végre! Enyhülés. Nyugalom.

LYRICA®
PREGABALIN
Gyors hatás, tartós enyhülés

A LYRICA (pregabalin) gyors és tartós enyhülést biztosít fájdalmas diabeteszes neuropátiában^{1,2}

Erős evidencia. Hatóanyag, melyet a nagy nemzetközi és nemzeti útmutatók mindegyike elsőként választandó szerként ajánl.³

- Hatása már az első héten jelentkezik¹
- Tartósan csillapítja a fájdalmat¹
- Javítja a krónikus fájdalomhoz társuló alvászavart és szorongást¹

A szokásos dózis napi 300 mg (150-600 mg)^{2,4}

Ár és támogatási információk*

Készítmény neve	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Emelt támogatási kategória (%)	Emelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)	Indikációs pont Eü90	Közfgygyon kiváltható-e
Lyrica® 75 mg kemény kapszula (56x)	10 115 Ft	10 115 Ft	90	9 104 Ft	1 011 Ft	2/b	Igen
Lyrica® 150 mg kemény kapszula (56x)	14 782 Ft	14 782 Ft	90	13 304 Ft	1 478 Ft	2/b	Igen

TB támogatás felnőtt cukorbeteg részére, fájdalmas neuropátiában az EÜ 90 2/b pontnak megfelelően. * Az aktuális árakért kérjük, keresse fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját. (www.neak.gov.hu) **Lyrica® 75 mg kemény kapszula 14x-es** ajánlott bruttó fogyasztói ára: 3 403 Ft, támogatás nélkül.



Lyrica® 75 mg, 150 mg kemény kapszula
Hatóanyag: pregabalin

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírást a <https://www.ogyel.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> webcímen a gyógyszer készítmény nevének keresésével tudja elérni. Az EMA ikonra kattintva megnyíló lapon az ABC szerint találja meg a készítményt (Browse A-Z / L ► Lyrica) majd a ► Product information ► Language ► HU = magyar ► GO útvonalon az alkalmazási előírást.

Referenciák:

1. Rosenstock J, et al. *Pain*. 2004;110:628-638.
2. Lyrica® alkalmazási előírás, 2017. november 16., 3. Kiss G. Ideggyógy Sz. 2015;68:93-98.
4. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N03AX16; utolsó megtekintés dátuma: 2018.03.01.



Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest
Alkotás u. 53. MOM Park "A" épület
Tel: 06-1-488-3700
www.pfizer.hu

Anyag lezárás dátuma: 2018. 03. 05.
PP-LYR-HUN-0004

Javítsa érintett betegek életminőségét, ajánljon BESZÉLŐ vércukormérő készüléket!



A diabetes a leggyakrabban
vaksághoz vezető
szisztémás betegség¹



A Dcont® MONDA vércukormérő készülék 2018. március 1-től társadalombiztosítási támogatással rendelhető² gyógyászati segédeszköz.

77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Zöldszám: 06 80 27 77 77 Tel.: 06 1 206 1480 Fax: 06 1 206 1481

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu www.dcont.hu www.e77.hu

A Dcont® MONDA vércukormérő IDEÁL Teszt tesztszettekkel működik.

¹Nemzeti Diabetesprogram, Diabetologia Hungarica 2011, XIX.évf., Suppl3.

²Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékoságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendelet szerinti látási fogyatékosok részére társadalombiztosítási támogatással, közgyógyellátásra is rendelhető.

Bruttó közfinanszírozási ár: 10.000,- Ft Nettó támogatás: 3.937,- Ft Bruttó térítési díj: 5.000,- Ft
Támogatási technika: NOMIN 50% Felírható mennyiség: 1 db / 72 hónap ISO-kód: 04 24 12 03 06 002



77 Elektronika Kft.
Alapítva 1986-ban

A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE

Dr. Szabó Gábor

a Szegedi Tudományegyetem rektora

A KONGRESSZUS ELNÖKE

Prof. Dr. Kempler Péter

PROGRAMBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Kempler Péter *(elnök)*

Dr. Várkonyi Tamás *(titkár)*

Prof. Dr. Barkai László

Dr. Halmos Tamásné

Dr. Hidvégi Tibor

Dr. Hosszúfalusi Nóra

Prof. Dr. Jermendy György

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Prof. Dr. Madácsy László

Prof. Dr. Winkler Gábor

Prof. Dr. Wittmann István

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Lengyel Csaba *(társelnök)*

Dr. Várkonyi Tamás *(társelnök)*

Prof. Dr. Ábrahám György

Prof. Dr. Barkai László

Prof. Dr. Kempler Péter

HELYSZÍN

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 62 546 600

Web: <http://www.u-szeged.hu/tik>

KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA



STAND-ART
Event Management

6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felső Tisza-part 31-34.

Tel: +36 62 999 950 • Fax: +36 62 661 331

E-mail: info@stand-art.hu

Számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16. • Asz.: 13970831-2-06

Dr. Bernáth Erika, ügyvezető *(szponzori támogatások, kiállítás)*

E-mail: erika@stand-art.hu

Dienes Zsuzsanna, project manager *(szállásfoglalás)*

E-mail: zsuzsa@stand-art.hu

Jakab Laura, pénzügyi asszisztens *(számlázás és pénzügyek)*

E-mail: laura@stand-art.hu

Garhuth Anita, project manager *(regisztráció és előadás absztraktok)*

E-mail: anita@stand-art.hu

Lacsán Dóra, project manager *(regisztráció)*

E-mail: dora@stand-art.hu

KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ

Április 19-én 12.00 - 18.30

Április 20-án 08.00 - 18.30

Április 21-én 08.00 - 18.00

Április 22-én 08.00 - 13.00

Regisztrációs iroda telefonszáma: +36 30 619 7348, +36 30 637 3404

A KONGRESSZUS HONLAPJA

www.diabet.hu/MDT2018

SZAKDOLGOZÓI PONTOK JÓVÁÍRÁSA

A szakdolgozói pontok jóváírásához szükséges adatok regisztrációja:

<http://stand-art.hu/urlap/MDT2018-Szakdolgozoi-urlap>

A kitöltéséhez számítógépet az MDT Standon és a regisztráción biztosítunk.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

MDT2018 RÉSZVÉTEL	2018. február 24. után és a helyszínen
MDT 35 év feletti orvos tagjai	47 000 Ft
MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és nem orvos tagjai	34 000 Ft
Nem MDT tag orvosok	53 000 Ft
Nem MDT tag szakdolgozó, ill. nem orvos	37 000 Ft
Kiállítók, cégképviselők	47 000 Ft
Orvostanhallgatók, 65 év felettiek, PhD hallgatók	33 000 Ft
Rezidensek	35 000 Ft
Betegszervezetek képviselői	37 000 Ft
Kísérők	35 000 Ft
Napidíj	20 000 Ft/nap

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsorák, hideg ebédcsomagok, kitűző, konferencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A regisztrációs díjak étkezéstartalma bruttó 6.900 Ft/nap, mely a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, hideg ebédcsomagot, kitűzőt, konferencia táskát a kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A napidíj étkezéstartalma bruttó 2.000 Ft, mely a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

Az MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2017 évre.

SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. A részvételi díjak étkezéstartalma külön tételként kerül a számlán feltüntetésre. Számlamódosítás, új számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2018. április 22-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség.

A résztvevő/megrendelő a jelentkezése során nyilatkozott, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Ügynökség Kft. további felek bevonásával, közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2018. március 19-ig volt lehetőség. Számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft + ÁFA. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja: 4.000,- Ft + ÁFA.

KONGRESSZUS HIVATALOS NYELVE

magyar

KONGRESSZUSI KITÜZŐK

A kongresszusi előadások és a kiállítás csak kitűzővel látogathatók.

TAXI



A kongresszus hivatalos személyszállítója a Rádió Taxi Három (hívószám: +36 62 480 480, +36 62 333 333), a kitűző felmutatásával az utazás az aktuálisan érvényes legalacsonyabb tarifával vehető igénybe.

TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÁRTYA

Az MDT2018 résztvevők utalvány ellenében kedvezményesen (2.600 Ft helyett 500 Ft-ért) vásárolhatnak a T.I.K. Kongresszusi irodában 72 órás tömegközlekedési kártyát, amely az első utazáskor érvényesíthető, és onnantól kezdve 72 óráig használható. Résztvevőnként csak 1 utalvány használható fel. **A KÁRTYA NEM VISSZAVÁLTHATÓ!**

INTERNET

A T.I.K. területén elérhető wireless hálózat adatai:

Network: SZTE-KONF

Jelszó: a T.I.K. ügyfélszolgálaton kérhető



TÁRSASÁGI PROGRAMOK

Helyszín: Városi Sportcsarnok

Fogadás: 2018. április 19., 19.30

Gálavacsora: 2018. április 20., 20.00

A Városi Sportcsarnok (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) távolsága a városközponttól (Széchenyi tér) 1,8 km, gyalogosan a Belvárosi Hídon keresztül kb. 22 perc alatt érhető el. A résztvevők a tömegközlekedési kártya igénybevételével a 60, 60Y, 67, 67Y, 72 és 72A autóbuszokkal juthatnak el a vacsorák helyszínére.

Helyszín: Fehértói Halászcserda és Panzió

Záróvacsora: 2018. április 21., 20.00

A Fehértói Csárda (6728 Szeged, Budapesti út 41.) távolsága a városközponttól 8,7 km. Tömegközlekedési kártyával a Mars térről induló 79H busszal közelíthető meg. A kongresszusi buszok 19:00-tól indulnak a Széchenyi térről illetve a Forrás Szállótól, és éjjel 1:00-ig közlekednek.

MDT STAND

Szeretettel várjuk a Magyar Diabetes Társaság webstandján, ahol minden, a Társasággal kapcsolatos információ beszerezhető. A Diabetologia Hungarica, az MDT honlapja (www.diabet.hu), a Diabetes páciensújság és annak honlapja (www.diabetes.hu) szolgáltatásairól itt tájékozódhat.

Kérjük a társaság tagjait, keressék fel a web-standot, ismerkedjenek meg honlapunk szolgáltatásaival, és frissítsék személyes adataikat az internetes tagnyilvántartásban.

A kiállításon a Tudomány Kiadó és az IntelliMed munkatársai vesznek részt.

ELŐADÁS ANYAGÁNAK LEADÁSA ÉS FELTÖLTÉSE

Kérünk minden előadót, hogy szíveskedjen a prezentáció anyagát min. 3 órával az előadás időpontja előtt leadni az átriumban található computer

szobában a technikusoknak. A reggeli előadásokat kérjük, hogy lehetőség szerint előző nap legyenek szívesek leadni.

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

A www.diabet.hu/mdt2018 honlapon a Szálláshelyek menüpont alatt található.

PARKOLÁS

A legtöbb szálláshely a vendégek számára zárt parkolási lehetőséget biztosít. Szeged belvárosában, ill. a konferencia helyszínén a fizető parkolóhelyeket előre váltott jogosultsággal lehet igénybe venni. A fizető parkolás időtartama munkanapokon 08:00 órától 18:00 óráig, valamint szombaton (a Mars tér környékén) 08:00 órától 12:00 óráig terjed. **FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY ÁPRILIS 21., SZOMBAT IS MUNKANAP!**

Mobil parkolás: Szegeden a 6720, 6721 zónakódokkal lehet a mobilfizetést indítani, attól függően, hogy melyik zónában várakozik a jármű.

Az új parkolási renddel, az új zónákkal kapcsolatosan a szegedi parkoló jegykiadó automatákon elhelyezett tájékoztatón, illetve a www.szepark.hu/parkolasinfo oldalon kapnak bővebb tájékoztatást.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

AKKREDITÁCIÓ

A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, endokrinológus, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxológus, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási programnak minősül. A kongresszuson részt vevő orvosok 24, szakdolgozók 12 akkreditációs pontot kapnak.

METFOGAMMA®

BIZTOS ALAP A DIABETES TERÁPIÁJÁBAN

3 támogatott kiszereléssel a személyre szabott terápiáért!

500 mg
850 mg
1000 mg

Metfogamma® 500 mg, 850 mg, 1000 mg filmtabletta rövidített alkalmazási előírás, hatóanyag: metformin-hidroklorid, ATC kód: A10BA02

Terápiás javallatok: A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése, különösen túlsúlyos betegek esetében, akiknél a diéta, illetve a testmozgás önmagában nem eredményez megfelelő vércukor kontrollt. Felültnél a Metfogamma® filmtabletta alkalmazható monoterápiában vagy kombinációban más antidiabetikumokkal, ill. inzulinnal. Gyermekeknél 10 éves kortól és serdülőknél a Metfogamma® filmtabletta monoterápiában vagy inzulinnal kombinálva adható. A diabetes szövődményeinek csökkenését mutatták ki felnőttek, túlsúlyos, 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél, akik a diéta sikertelenségét követően elsőként metformin terápiában részesültek. **Adagolás és alkalmazás:** Normál veseműködésű felnőttek (GFR $\geq$ 90 ml/perc): monoterápiában és egyéb orális antidiabetikumokkal való kombinációban: A szokásos kezdő adag naponta 2-3-szor 500 mg vagy 850 mg metformin-hidroklorid étkezés közben vagy után. 10-15 nap után a dózist a vércukorszint alapján kell módosítani. A metformin-hidroklorid maximálisan javasolt adagja napi 3 g, három adagra elosztva. **Veseelégtelenség:** A GFR értékét a metformin tartalmú készítménnyel folytatott kezelés megkezdése előtt és a kezelés során legalább évente ellenőrizni kell. A veseelégtelenség további romlása szempontjából fokozott figyelmet kell fordítani a veseelégtelenség gyakoriságára, például 3-6 havonta történő ellenőrzésre szükséges.

GFR ml/perc	Maximális napi összdózis (2-3 részre elosztva)	További megfontolások
60-89	3000 mg	A csökkenő vese működéshez mérten megfontolandó az adagolás csökkentése.
45-59	2000 mg	A laktacidózis kockázatát esetlegesen növelő tényezőket szamba kell venni, mielőtt a metforminkezelés megkezdése felmerül.
30-44	1000 mg	A kezdő dózis legfeljebb a maximális adag fele.
< 30	-	A metformin ellenjavallt.

Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Akut metabolikus acidózis bármely formája (például laktacidózis, diabéteszes ketoacidózis). Súlyos veseelégtelenség (GFR < 30 ml/perc). Akut állapotok, melyek a vese működés megváltozásához vezethetnek (dehidratáció, súlyos fertőzések, shock), jódtartalmú kontrasztanyagok intravasculáris alkalmazása. Akut vagy krónikus betegségek, melyek szöveti hypoxiát eredményezhetnek pl.: keringési vagy légzési elégtelenség, akut myocardialis infarctus, shock. Májelégtelenség, akut alkohol-intoxikáció, alkoholizmus. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A kezelés kezdetekor a leggyakoribb mellékhatások a hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom és étvágytalanság, amelyek a legtöbb esetben maguktól elmúlnak. Ennek elkerülésére ajánlatos a metformin napi adagját 2-3 részre elosztani, és lassan emelni az adagokat; étkezés közben vagy azt követően javasolt bevenni. Megváltozott ízérzés. **Kiadhatóság:** Készletigazgatási rendszerek közötti gyógyszer (V). Osztyázás: II. csoport. **Metfogamma® 500 mg és 850 mg filmtabletta:** A forgalomba hozatali engedély első kiadásának / legutóbbi megújításának dátuma: 2001. 10. 25. / 2011. 02. 16. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2017.04.26. **Metfogamma® 1000 mg filmtabletta:** A forgalomba hozatali engedély első kiadásának / legutóbbi megújításának dátuma: 2008. május 13. / 2011. június 4. **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2017.04.26. **Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírásait!**

Társadalombiztosítás által támogatott kiszerelések: **Metfogamma® 850 mg 60x Br. fogy. ár:** 526 Ft | Normatív támogatási összeg: 188 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 338 Ft **Metfogamma® 850 mg 120x Br. fogy. ár:** 1.055 Ft | Norm. tám. összeg: 376 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 679 Ft **Metfogamma® 1000 mg 30x Br. fogy. ár:** 432 Ft | Norm. tám. összeg: 216 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 216 Ft. **A Metfogamma® 1000 mg 30x közgyógy keret terhére felirható.** Aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon találhatóak. A Metfogamma® 500 mg 30x, a Metfogamma® 850 mg 30x és a Metfogamma® 1000 mg 120x nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban, ezért ezek árai patikánként eltérőek lehetnek.

*Metfogamma® 1000 mg 30x (KGy keret terhére írható), valamint Metfogamma® 850 mg 60x és 120x. Források: www.neak.gov.hu

A Magyar Diabetes Társaság
aranyfokozatú támogatója

Wörwag Pharma Kft.
1021 Bp., Húvösvölgyi út 54.
Tel.: (1) 345-7350



getting closer
helping better

info@woerwagpharma.hu
www.woerwagpharma.hu
Fax: (1) 345-7353

Magyarország általános egészségügyi közkeletű programja

Egészségvédelmi
Szűrőprogram
Egységnyi minőségű élet...
aranyfokozatú főtámogatója

MDT2018 – ÁTTEKINTŐ PROGRAM

2018. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
14.00-14.30	Megnyitó/MDT Közgyűlés első időpontja		
14.30-15.00	MDT Diabetes EPI projekt (üléssel-nők: Prof. Dr. Madácsy László, Prof. Dr. Kempler Péter, előadók: Prof. Dr. Jermendy György, Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Barkai László)		
15.00-15.30			
15.30-16.00			
16.00-16.30	Szünet		
16.30-17.00	Prof. Dr. Halmos Tamás felkért referátuma		
17.00-17.30	Prof. Dr. Rovó László felkért referátuma		
17.30-18.00	Boehringer Ingelheim szimpózium (Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Ábrahám György, Dr. Várkonyi Tamás)		
18.00-18.30			
19.30	Vacsora (Városi Sportcsarnok)		

2018. ÁPRILIS 20., PÉNTEK

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
08.30-09.00	Inzulinkezelés	Neuropathia	Esetbemutatósok 08:30 - 09:45
09.00-09.30			
09.30-10.00			
10.00-10.30	Szünet		
10.30-11.00	Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózi- um I. (Prof. Dr. Kempler Péter, Dr. Molnár Gergő Attila, Prof. Dr. Jer- mendy György, Dr. Hosszúfalusi Nóra)	Pfizer Kft. szimpózi- um (Prof. Dr. Ábrahám György, Prof. Dr. Járai Zol- tán, Dr. Marton Imelda)	
11.00-11.30			
11.30-12.00	AstraZeneca Kft. szimpózi- um (Prof. Dr. Ábrahám György, Dr. Ker- esztes Katalin, Dr. Brasnyó Pál, Prof. Dr. Lengyel Csaba)	Egis Gyógyszergyár Zrt. szimpó- zi-um (Prof. Dr. Kempler Péter, Prof. Dr. Gerő László, Dr. Várkonyi Ta- más)	
12.00-12.30			

MDT2018 – ÁTTEKINTŐ PROGRAM

2018. ÁPRILIS 20., PÉNTEK

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
12.30-13.00	Ebéd		
13.00-13.30			
13.30-14.00	Somogyi Award (<i>Prof. Roger Lehmann</i>)		
14.00-14.30	Hetényi Géza díj átadása és emlékelőadás Prof. Dr. Lengyel Csaba		
14.30-15.00	Az Év Ifjú Diabetológusa - Tamás Gyula emlékelőadás (<i>Dr. Sipter Emese</i>)		
15.00-15.30	Szünet		Szünet
15.30-16.00	77 Elektronika Kft. szimpózium (<i>Prof. Dr. Wittmann István, Zettwitz Sándor, Szabó Barnabás, Dr. Vándorfi Győző, Dr. Török András</i>)	Medtronic Hungária Kft. szimpózium (<i>Dr. Kocsis Győző, Dr. Hosszúfalusi Nóra, Dr. Kis János, Dr. Bagosi Zoltán</i>)	
16.00-16.30			
16.30-17.00	Lilly Hungária Kft. szimpózium I. (<i>Prof. Dr. Wittmann István, Dr. Takács Róbert</i>)	Novartis Hungária Kft. szimpózium (<i>Prof. Dr. Jermendy György, Dr. Várkonyi Tamás, Dr. Domboróczki Zsolt, Dr. Bódis Beáta</i>)	
17.00-17.30			
17.30-18.00	Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium (<i>Prof. Dr. Kempler Péter, Dr. Hermányi Zsolt, Dr. Hidvégi Tibor, Prof. Dr. Lengyel Csaba</i>)		
18.00-18.30			
20.00	Vacsora (Városi Sportcsarnok)		

2018. ÁPRILIS 21., SZOMBAT

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
08.30-09.00	GLP-agonista-bázis inzulin analóg fix kombináció	Diabetes kóroktan, klasszifikáció	8:15-től Szakdolgozói szekció
09.00-09.30			
09.30-10.00	Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium II. (<i>Dr. Hermányi Zsolt, Prof. Dr. Lengyel Csaba, Dr. Sudár Zsolt, Dr. Kocsis Győző</i>)	Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. szimpózium (<i>Dr. Tabák Gy. Ádám, Dr. Hermányi Zsolt, Dr. Putz Zsuzsanna, Dr. Nagy Viktor</i>)	
10.00-10.30			
10.30-11.00	Szünet		Szünet

2018. ÁPRILIS 21., SZOMBAT

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
11.00-11.30	MDT közgyűlés, II. időpont		
11.30-12.00			
12.00-12.30			
12.30-13.00			
13.00-13.30	Ebéd		
13.30-14.00			
14.00-14.30	MSD Pharma Hungary Kft. (Prof. Dr. Jermendy György, Dr. Masszi Gabriella, Dr. Barna István)	Lilly Hungária Kft. szimpózium II. (Dr. Földesi Irén, Dr. Gaál Zsolt, Kicsák Marian)	
14.30-15.00			
15.00-15.30	Tiszteletbeli tag I. - Prof. Nikolaos Papanas, Greece: „Prediabetic neuropathy”		
15.30-16.00	Tiszteletbeli tag II. - Prof. Thomas Danne, Germany: „New horizons for type 1 diabetes: closed loop and oral adjunct therapy”		
16.00-16.30	Chairs: Roger Lehmann, Helmut Schatz; MDT/FID CEDA szimpózium; Prof. Leif Groop: „A new subclassification of Type 2 Diabetes - steps toward precision medicine”; Prof. Helmut Schatz: „60 years of metformin: 1957-2017”		
16.30-17.00			
17:15-18:00	Edukációs munkacsoport ülése		
20.00	Vacsora (Fehértói Halászcseré)		

MDT2018 – ÁTTEKINTŐ PROGRAM

2018. ÁPRILIS 22., VASÁRNPAP

IDŐPONT	KONGRESSZUSI TEREM	B SZEKCIÓ	C SZEKCIÓ
08:30-09.00	8:15-től 2-es típusú diabetes kezelése	8:15-től Gyermekdiabetes – MDT Gyermekdiabetes Szekció programja	Diabeteshez társuló kórállapotok I.
09.00-09.30			
09.30-10.00	Szünet		
10.00-10.30	Epidemiológia, prevenció	Diabeteses láb	Experimentális tanulmányok
10.30-11.15			
11.15-11.30	Szünet		
11.30-12.00	Diabeteshez társuló kórállapotok II.	Önellenőrzés, terápia	
12.00-12.30			
12.30-13.00	Zárás		
13.00-13.30	Ebéd		

MDT2018 – TUDOMÁNYOS PROGRAM

2018. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK – KONGRESSZUSI TEREM

14:00 – 14:30 **Megnyitó/MDT Közgyűlés I. időpontja**

14:30 – 16:00 **MDT Diabetes EPI projekt újabb eredményei**

Üléselnökök: Prof. Dr. Madácsy László, Prof. Dr. Kempler Péter

Prof. Dr. Kempler Péter: Bevezető gondolatok

A kor jelentősége az összmortalitás és a kardiovaszkuláris morbiditás kockázatának kialakulásában, 2-es típusú cukorbetegségben, hazánkban

Wittmann István Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kiss Zoltán Dr.,⁽¹⁾ Rokszin György Dr.,⁽²⁾ Abonyi-Tóth Zsolt,^(2,3) Aradi Dániel Dr.,⁽⁴⁾ Jermendy György Prof. Dr.,⁽⁵⁾ Kempler Péter Prof. Dr.,⁽⁶⁾

¹II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, ²RxTarget Kft, Szolnok, ³Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, ⁴Balatonfüredi Szívkórház és Szív és Érgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest, ⁵Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ⁶I. sz. Belgyógyászati Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az új, innovatív antidiabetikumok (DPP-4-gátlók, SGLT-2-gátlók, GLP-1-receptoragonisták) perzisztenciája 2-es típusú diabetesben

Jermendy György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kiss Zoltán Dr.,⁽²⁾ Rokszin György Dr.,⁽³⁾ Abonyi-Tóth Zsolt,^(3,4) Wittmann István Prof. Dr.,⁽²⁾ Kempler Péter Prof. Dr.,⁽⁵⁾

¹Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ²Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Pécs, ³RxTarget Kft, Szolnok, ⁴Szent István Egyetem, Budapest, ⁵Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A gyermek- és serdülőkorú 1-es és 2-es típusú cukorbetegség epidemiológiai adatai Magyarországon 2001-2013 között

Barkai László Prof. Dr.,⁽¹⁾ Kiss Zoltán Dr.,⁽²⁾ Roxin György Dr.,⁽³⁾ Abo-nyai-Tóth Zsolt Dr.,^(3,4) Jermendy György Prof. Dr.,⁽⁵⁾ Wittmann István Prof. Dr.,⁽²⁾ Kempler Péter Prof. Dr.,⁽⁶⁾

¹Gyermekegyógyászati Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Kassai Safarik Egyetem, Kassa, ²II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, ³RxTarget Kft, Szolnok, ⁴Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, ⁵Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ⁶I. sz. Belgyógyászati Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

16:00 – 16:30 *Szünet*

16:30 – 17:30 **Felkért referátumok**

Üléselnökök: Prof. Dr. Kempler Péter, Dr. Várkonyi Tamás

Összefüggés a diabéteszes szövődmények kialakulása és a glukóz variabilitás/hyper/hypoglycaemia között

Prof. Dr. Halmos Tamás

A belső fül és a hallópálya, hallókéreg komplex objektív vizsgáló módszerei- további lehetőségek a diabetes centrális eltéréseinek vizsgálatára

Prof. Dr. Rovó László

17:30 – 18:30 **Boehringer Ingelheim szimpózium**

Szívügyünk a diabétesz!

Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István

Édes élet - kevesebb cukorral: Empagliflozin diabetológus szemmel

Dr. Várkonyi Tamás

Empagliflozin - Biztos megoldás a cardiometabolicus continuum-ban

Prof. Dr. Ábrahám György

19:30 – *Vacsora (Városi Sportcsarnok)*

2018. ÁPRILIS 20., PÉNTEK – KONGRESSZUSI TEREM

08:30 – 10:00 INZULINKEZELÉS, INZULINPUMPA

Üléselnökök: Prof. Dr. Gerő László, Prof. Dr. Winkler Gábor

Inzulinpumpa kezelés hatása az életminőségre 1-es típusú cukorbetegségben

Sármán Beatrix Dr.,⁽¹⁾ Lemesánszky Zelma,⁽²⁾

¹Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, ²Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyész és Biomérnöki Kar

Szenzoros inzulinpumpa (SAP) használata extrém fizikai terhelés során 1-es típusú diabetes mellitusban

Török András Dr.,⁽¹⁾ Brasnyó Pál PhD.,⁽²⁾

¹B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházi és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc, ²Siófoki Kórház, Siófok

Closing the Loop 2.0 – Robusztusság vs személyre szabhatóság

Kovács Levente Prof. Dr.,⁽¹⁾ Eigner György PhD.,⁽¹⁾ Barkai László Prof. Dr.,⁽²⁾

¹Óbudai Egyetem, Élettani Szabályozások Kutatóközpont, Budapest, ²Kassai Safarik Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekgyógyászati Klinika, Kassa

Degludec inzulinra állítás tapasztalatai, S6 EasySense folyamatos glukóz monitorral történt, 2 héten át tartó követés során nyert adatok elemzése alapján

Békefi Réka Dr.,⁽¹⁾ Réka Podolyák Dr.,⁽¹⁾ Hermányi Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyászati Osztály, Budapest

Az inzulinkezelésre vonatkozó terápiahűség vizsgálata felnőtt cukorbeteg körében

Szerencsi Regina Dr.,⁽¹⁾ Bótyik Balázs Dr.,⁽¹⁾ Tárnok Enikő Dr.,⁽¹⁾ Spröber Zita Dr.,⁽¹⁾ Fekete Magdolna,⁽¹⁾ Nyisztorné Árgyelán Klára,⁽¹⁾ Taybani Zoltán Dr.,⁽¹⁾

¹Békés Megyei Központi Kórház – Dr. Réthy Pál Tagkórház, III. sz. Belgyógyászat, I. sz. Endokrinológia Osztály

**Glargin 300E/ml és glulizin alapú bázis-bólus terápia hatékonysága
2-es típusú cukorbetegekben – a TOUJEO-6M vizsgálat**

*Hidvégi Tibor Dr., ⁽¹⁾ Balogh Zoltán Dr., ⁽²⁾ Vass Viktor Dr., ⁽³⁾ Kovács
Gábor Dr., ⁽⁴⁾ Stella Péter Dr., ⁽⁴⁾*

¹Petz Aladár Megyei Kórház, Győr, ²DE KK Belgyógyászati Klinika, ³Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest, ⁴Sanofi Aventis Magyarország

10:00 – 10:30 *Szünet*

10:30 – 11:30 **Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium I.**

Új mérőldkő a bázis inzulin kezelésben

Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

Degludek: egyedi molekulaszervezet és farmakológia

Dr. Molnár Gergő Attila

**A degludek klinikai vizsgálati programja: Fókuszban a kettősvak
vizsgálati evidenciák**

Prof. Dr. Jermendy György

Degludek a klinikai gyakorlatban

Dr. Hosszúfalusi Nóra

11:30 – 12:30 **AstraZeneca Kft. szimpózium**

Üléselnök: Prof. Dr. Ábrahám György

A korai, hatékony antidiabetikus terápia napjainkban

Dr. Keresztes Katalin

Kardiovaszkuláris kimenetel vizsgálatok – mi történt eddig?

Dr. Brasnyó Pál

Tapasztalatok a klinikumban: a CVD-Real vizsgálat jelentősége

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Diszkusszió

12:30 – 13:30 *Ebéd*

13:30 – 14:00 Somogyi Award (Prof. Roger Lehman)

14:00 – 14:30 Hetényi Géza díj átadása és emlékelőadás (Prof. Dr. Lengyel Csaba)

14:30 – 15:00 Az „Év Ifjú Diabetológusa” díj átadása – Tamás Gyula emlékelőadás (Dr. Sipter Emese)

15:00 – 15:30 *Szünet*

15:30 – 16:30 **77 Elektronika Kft. szimpózium**

Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István

Generációkon átívelő innováció és jövő a 77 Elektronikánál

Zettwitz Sándor, Szabó Barnabás

HbA1c és teljes diabétesz panel - azonnal, helyben!

Dr. Vándorfi Győző

Infokommunikációs eszközök a gyermekdiabetológiában - digitális vércukornapló

Dr. Török András

16:30 – 17:30 **Lilly Hungária Kft. szimpózium I.**

Újabb paradigmaváltás a 2-es típusú diabetes kezelésében?

Heti adagolású GLP-1 receptor-agonisták – aktuális kérdések az új adatok tükrében

Prof. Dr. Wittmann István

Benfogamma 300 mg

**Nagy dózisú benfotiamin és legalább
3 hónapon át tartó kezelés javíthatja
a diabeteses neuropathia kórlefolását.^{1,2}**

Közyógyellátás
terhére felírható!



Benfogamma 300 mg filmtabletta rövidített alkalmazási előírás, 300 mg benfotiamin, ATC kód: A11DA03

Terápiás javallatok: A Benfogamma 300 mg filmtabletta B1-vitaminhiány okozta neuropathiák és cardiovascularis betegségek kezelésére ajánlott. A terápiás javallat a klinikai B1-vitaminhiányos állapotok kezelése, ha ezeket étrendi eszközökkel nem lehet megoldani. **Adagolás és alkalmazás:** Az ajánlott adag 1 filmtabletta naponta egyszer. Az alkalmazás időtartama a terápia eredményességétől függ. Neuropathiák kezelésére kezdetben a Benfogamma 300 mg filmtablettát legalább 3 hétig kell szedni. Ezután a fenntartó kezelést a terápia válaszához kell igazítani. Abban az esetben, ha a terápiás válasz 4 hét után hiányzik vagy nem kielégítő, a terápiát felül kell vizsgálni. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, tiaminnal vagy a készítmény 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon ritka: túlérzékenységi reakciók (urticaria, exanthema), gastrointestinalis zavarok (pl. hányás). Ezen mellékhatások gyakorisága nem különbözött szignifikánsan a placebóval kezelt csoporttól. A benfotiaminnal való oki összefüggés nem kielégítően tisztázott, és dózistól függhet. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, 71034 Böblingen, Calwer Str. 7., Németország. **A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma:** 2012.03.08. **A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma:** 2016.04.06. **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2016.04.06. Benfogamma 300 mg filmtabletta bruttó fogy. ár: 5103 Ft, Normatív támogatás összege: 0 Ft, Térítési díj norm. tám. esetén: 5103 Ft. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását. Aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon találhatók.

¹A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegség kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. A 119. o. alapján átvett és szerkesztett idézet.
²Benfogamma 300 mg filmtabletta alkalmazási előírása. www.ogyei.gov.hu

Szabad kombináció – Az intenzifikálás új korszaka?

Dr. Takács Róbert

17:30 – 18:30 Sanofi-Aventis Zrt. szimpózium

Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter

Való élet vizsgálatok Gla-300 inzulinnal. Nemzetközi kitekintés és hazai adatok

Dr. Hidvégi Tibor

Klinikai evidencia vs mindennapi gyakorlat. Az első klinikai tapasztalatok iGlarLixi-vel

Dr. Hermányi Zsolt

2. generációs bázis inzulin analógok. Hasonlóságok, különbségek

Prof. Dr. Lengyel Csaba

20:00 – *Vacsora (Városi Sportcsarnok)*

2018. ÁPRILIS 20., PÉNTEK – B SZEKCIÓ

08:30 – 10:00 NEUROPATHIA

Üléselnökök: Dr. Putz Zsuzsanna, Prof. Dr. Jermendy György

Korai szenzoros hyperaesthesia polycystás ovarium szindrómában szenvedő nőbetegekben

Magony Sándor Dr., ⁽¹⁾ Nyiraty Szabolcs Dr., ⁽¹⁾ Pesei Fruzsina Dr., ⁽¹⁾ Tóth Bettina Dr., ⁽¹⁾ Orosz Andrea Dr., ⁽²⁾ Lengyel Csaba Dr., ⁽¹⁾ Ábrahám György Dr., ⁽¹⁾ Kempler Péter Dr., ⁽³⁾ Várkonyi Tamás Dr., ⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, ²Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, ³Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, Budapest

Az autonóm és a szenzoros neuropathia összefüggése az öszzmortalitással – retrospektív kohorsz vizsgálat

Horváth Viktor J. PhD., ⁽¹⁾ Svébis Márk Márton Dr., ⁽¹⁾ Körei Anna

PhD., ⁽¹⁾ Fadgyas-Freyler Petra, ⁽²⁾ Korponai Gyula, ⁽²⁾ Tünczer Tímea Dr., ⁽³⁾ Domján Beatrix Dr., ⁽¹⁾ Kempler Péter Prof. Dr., ⁽¹⁾ Tabák Gy. Ádám PhD., ⁽¹⁾⁽⁴⁾

¹Semmelweis Egyetem ÁOK, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, ²Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Stratégiai Elemzési Főosztály, ³Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Budapest, ⁴University College London, Department of Epidemiology and Public Health, London, Egyesült Királyság

A szenzoros és autonóm funkciók károsodása kimutatható 2-es típusú diabetes mellitus kialakulása szempontjából fokozott kockázattal rendelkező, de szénhidrát-anyagcserezavarban nem szenvedő egyéneknél

Vági Orsolya Dr., ⁽¹⁾ Körei Anna Dr., ⁽¹⁾ Putz Zsuzsanna Dr., ⁽¹⁾ Istenes Ildikó Dr., ⁽¹⁾ Hajdú Noémi, ⁽¹⁾ Torzsa Péter Dr., ⁽¹⁾ Kempler Péter Prof. Dr., ⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, ²Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék

Az autonóm és szenzoros neuropathia valamint a gyomorürülés szerepe a visszatérő súlyos hypoglykaemia kialakulásában 1-es típusú diabetesben

Pesei Fruzsina Dr., ⁽¹⁾ Nyiraty Szabolcs Dr., ⁽¹⁾ Tóth Bettina Dr., ⁽¹⁾ Fehértemplomi Katalin Dr., ⁽¹⁾ Orosz Andrea, ⁽³⁾ Lengyel Csaba, ⁽¹⁾ Pávics László Dr., ⁽²⁾ Ábrahám György Dr., ⁽¹⁾ Kempler Péter Dr., ⁽⁴⁾ Várkonyi Tamás Dr., ⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, ²Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet, ³Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, ⁴Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, Budapest

A tartós kézizomfeszítést kísérő diasztolés vérnyomás-emelkedés (handgrip teszt) és az ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM) paraméterei: van összefüggés?

Körei Anna Erzsébet Dr., ⁽¹⁾ Kempler Miklós Dr., ^(1, 2) Putz Zsuzsanna Dr., ⁽¹⁾ Vági Orsolya Erzsébet Dr., ⁽¹⁾ Istenes Ildikó Dr., ⁽¹⁾ Kempler Péter Prof. Dr., ⁽¹⁾ Hajdú Noémi, ⁽³⁾

¹Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika, ²Semmelweis Egyetem, III.sz. Belgyógyászati Klinika, ³Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A glukózvariabilitás, a hypoglykaemia gyakoriság és az autonóm neuropathia összefüggése 1-es típusú diabetesben

Nyiraty Szabolcs Dr., ⁽¹⁾ *Pesei Fruzsina Dr.,* ⁽¹⁾ *Tóth Bettina Dr.,* ⁽¹⁾ *Orosz Andrea Dr.,* ⁽²⁾ *Coluzzi Sara Dr.,* ^(4, 5) *Lengyel Csaba Dr.,* ⁽¹⁾ *Ábrahám György Dr.,* ⁽¹⁾ *Frontoni Simona Dr.,* ^(4, 5) *Kempler Péter Dr.,* ⁽³⁾ *Várkonyi Tamás Dr.,* ⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, ²Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, ³Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika, Budapest, ⁴Department of Systems Medicine, University of Rome Tor Vergata, Róma, ⁵Unit of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hospital, Róma

10:00 – 10:30 *Szünet*

10:30 – 11:30 **Pfizer Kft. szimpózium**

A betegellátás javítása NOAC-ok segítségével a vénás tromboembóliák kezelésében

Üléselnök: Prof. Dr. Ábrahám György

NOAC-ok használata a VTE kezelésében – változás a klinikai gyakorlatban

Prof. Dr. Járai Zoltán

A visszatérő VTE megelőzése – milyen hosszan kezeljük betegeinket?

Dr. Marton Imelda

Nefrológiai szempontok a NOAC-választásban

Prof. Dr. Ábrahám György

Diszkusszió

11:30 – 12:30 Egisz Gyógyszergyár Zrt. szimpózium

Miért a szitagliptin?

Prof. Dr. Kempler Péter

Prandiális csontreszorpció gátlás: A gasztrointesztinális hormonok szerepe. A DPP-4 gátlók jelentősége

Prof. Dr. Gerő László

Az időskori 2-es típusú diabetes jellegzetességei. Adatok a szitagliptin biztonságosságáról

Dr. Várkonyi Tamás

12:30 – 13:30 *Ebéd*

15:00 – 16:30 Medtronic Hungária Kft. szimpózium

Moderátor: Dr. Kocsis Győző, Budapest

A technológia fejlődése, ami megváltoztatja a T1DM kezelését

Dr. Hosszúfalusi Nóra, Budapest

A szenzoros inzulinpumpa mint „standard of care”

Pro: Dr. Kis János, Budapest

Kontra: Dr. Bagosi Zoltán, Zalaegerszeg

„Merre tovább?” – új irányok hazánkban...

Dr. Kocsis Győző

16:30 – 17:30 Novartis Hungária Kft. szimpózium

10 éve együtt az úton

Üléselnök: Prof. Dr. Jermendy György

A megfontolt társválasztás

Dr. Várkonyi Tamás

Indulás 7 után

Dr. Bódis Beáta

Megbízható társ a hosszú úton is

Dr. Domboróczki Zsolt

Tények és ellentmondások az idős cukorbetegek kezelése során

Dr. Domboróczki Zsolt

20:00 – *Vacsora (Városi Sportcsarnok)*

2018. ÁPRILIS 20., PÉNTEK – C SZEKCIÓ

08:30 – 09:45 ESETBEMUTATÁSOK

Üléselnökök: Prof. Dr. Wittmann István, Dr. Hermányi Zsolt

Prekoncepcionális gondozás kapcsán felismert MODY 2 és perikardiális ciszta társulása fiatal nőbetegnél – esetismertetés

Tánczer Tímea Dr.,⁽¹⁾ Svébis Márk Dr.,⁽²⁾ Csubák Leó,⁽³⁾ Tabák Gy. Ádám Dr.,^(2, 4)

¹Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Budapest,

²Semmelweis Egyetem. I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest,

³Belvárosi Anyagcsere Centrum, Budapest,

⁴University College London, Epidemiológiai és Népegészségtani Tanszék, London, Egyesült Királyság

Szokatlanul hosszú remissziót mutató 1-es típusú diabetes, terhesség alatti extrém magas átmeneti inzulin igény

Fövényi József Dr.,⁽¹⁾ Páncsél Pál Dr.,⁽²⁾ Thaisz Erzsébet Dr.,⁽¹⁾

¹Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Diabetes Szakrendelő, ²Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika

Poliendokrin kórkép és terhesség (1-es típusú diabetes mellitus- Basedow-kór- terhesség)

Papp Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Szfárli Enikő Dr.,⁽¹⁾ Fülöp Erika Dr.,⁽¹⁾ Molnár Márta Dr.,⁽¹⁾ Veres Dóra Eszter Dr.,⁽¹⁾ Gincsei Ildikó Dr.,^(2, 2) Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ²Diabetológiai Szakrendelés, Nyírbátor

Elhízott cukorbeteg: Mit tehetünk a klinikai gyakorlatban?

Szárli Enikő Dr., ⁽¹⁾ Kicsák Marian, ⁽¹⁾ Papp Zsuzsanna Dr., ⁽¹⁾ Fehérvári Mária Dr., ⁽¹⁾ Molnár Márta Dr., ⁽¹⁾ Veres Dóra Eszter Dr., ⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr., ⁽¹⁾

¹Jósa András Oktatókórház, IV. sz. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

Túlevéses zavarban is szenvedő beteg – kihívás a diabetológus számára (esetbemutató)

Fehérvári Mária Dr., ⁽¹⁾ Szárli Enikő Dr., ⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr., ⁽¹⁾

¹Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

20:00 – *Vacsora (Városi Sportszarnok)*

2018. ÁPRILIS 21., SZOMBAT – KONGRESSZUSI TEREM

08:30 – 09:30 GLP-1 AGONISTA-BÁZIS INZULIN ANALÓG FIX KOMBINÁCIÓ

Üléselnökök: Dr. Hidvégi Tibor, Prof. Dr. Korányi László

Komplex inzulinkezelési rezsimek egyszerűsítése a jó glikémiás kontroll megőrzésével 2-es típusú diabetesben

Taybani Zoltán Dr., ⁽¹⁾ Bótyik Balázs Dr., ⁽¹⁾ Katkó Mónika, ⁽²⁾ Gyimesi András Dr., ⁽¹⁾

¹Békés Megyei Központi Kórház – Dr. Réthy Pál Tagkórház, III. sz. Belgyógyászat, I. sz. Endokrinológiai Osztály, Békéscsaba, ²Debreceni Egyetem - Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, Endokrinológiai Nem Önálló Tanszék, Debrecen

Valós alternatívája-e az ideglira kezelés az intenzív konzervatív inzulinterápiának?

Bandur Szilvia Dr., ⁽¹⁾ Szépkúti Sándor Dr., ⁽¹⁾ Kovács Gábor PhD.,

⁽¹⁾ *Ferenci Tamás PhD.*, ⁽²⁾ *Tabák Gy. Ádám PhD.*, ⁽³⁾ *Turbucz Piroska Dr.*, ⁽¹⁾

¹Pest Megyei Flór Ferenc Kórház/Diabetológia, Kistarcsa, ²Óbudai Egyetem/Élettani Szabályozások Kutatóközpont, Budapest, ³Semmelweis Egyetem ÁOK/I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Elmélet és gyakorlat találkozása diabeteszes járóbetegeink körében

Gincsei Ildikó, ⁽¹⁾ *Demeter Annamária*, ⁽²⁾ *Veres Dóra*, ⁽²⁾ *Molnár Márta*, ⁽²⁾ *Papp Szusanna*, ⁽²⁾ *Gaál Zsolt*, ⁽²⁾

¹SZSZBMK Nyírbátor Diabetes Szakrendelés, ²SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház IV.sz. Belgyógyászat

Degludek /liraglutid és glargin /lixisenatid fix kombinációs készítmények hatásosságának összehasonlítása metaanalízissel

Svébis Márk Márton Dr., ⁽¹⁾ *Lovász Barbara Dorottya PhD.*, ⁽¹⁾ *Tabák Gy. Ádám PhD.*, ^(1, 2)

¹Semmelweis Egyetem ÁOK, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, ²University College London, Department of Epidemiology and Public Health, London, Egyesült Királyság

09:30 – 10:30 **Novo Nordisk Hungária Kft. szimpózium II.**

GLP-1 receptor agonista alapú kezelés jelentősége a 2-es típusú diabéteszes betegek széles spektrumában

Üléselnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba

Kardiovaszkuláris rizikó csökkentés liraglutiddal 2-es típusú cukorbetegségben

Dr. Hermányi Zsolt

Az ideális bázis inzulin/GLP-1 receptor agonista fix kombináció

Dr. Sudár Zsolt

Szemléletváltás a 2-es típusú diabétesz inzulin kezelésben – a DUAL VII vizsgálat

Dr. Kocsis Győző

10:30 – 11:00 *Szünet*

11:00 – 13:00 MDT közgyűlés II. időpontja

13:00 – 14:00 *Ebéd*

14:00 – 15:00 MSD Pharma Hungary Kft. szimpózium

HOLOGRÁFIA ELŐSZÖR AZ MDT KONGRESSZUSON

Beszélgessünk együtt 3D-ben betegünkkel!

Moderátor: Prof. Dr. Jermendy György – c. egyetemi tanár

Bajcsy Zsilinszky Kórház

Kerekasztal résztvevők:

Dr. Barna István – egyetemi docens, nephrológus, hypertonológus

Dr. Masszi Gabriella – osztályvezető főorvos, kardiológus, hypertonológus

15:00 – 15:30 **Tiszteletbeli tag I.** - Prof. Nikolaos Papanas (Greece): Pre-diabetic neuropathy

15:30 – 16:00 **Tiszteletbeli tag II.** – Prof. Thomas Danne (Germany): New horizons for type 1 diabetes: closed loop and oral adjunct therapy

16:00 – 17:00 **MDT/FID CEDA szimpózium**

Chairs: Prof. Roger Lehmann, Prof. Helmut Schatz

A new subclassification of Type 2 Diabetes – steps toward precision medicine

Prof. Leif Groop

60 years of metformin: 1957 – 2017

Prof. Helmut Schatz

17:15 – 18:00 **Edukációs munkacsoport ülése**

20:00 – *Vacsora (Fehértói Halászcserda)*

08:30 – 09:30 **DIABETES KÓROKTAN, KLASSZIFIKÁCIÓ**

Üléselnökök: Dr. Hosszúfalusi Nóra, Dr. Gaál Zsolt

A 2-es típusú diabetes OGTT-n alapuló diagnózisának megerősítése HbA1c-vel – Kiket veszítünk el?

Tabák Gy. Ádám Dr.,^(1,2) Brunner Eric J. Prof.,⁽²⁾ Kivimäki Mika Prof.,⁽²⁾

¹Semmelweis Egyetem ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, ²University College London, Népegészségtani és Epidemiológiai Tanszék, London, Egyesült Királyság

Inzulinszerű növekedési faktorok metabolikus hatásai élettani és kóros állapotokban

Halmos Tamás Dr.,⁽¹⁾ Suba Ilona Dr.,⁽²⁾

¹Szeretetkórház, Metabolikus Ambulancia, Budapest, ²Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Tüdőgyógyozó, Budapest

Időnként semmi sem az aminek látszik; a klasszifikáció jelentősége a cukorbetegség kezelésében négy eset kapcsán

Kempler Miklós Dr.,⁽¹⁾ Varga Éva Dr.,⁽¹⁾ Baló Tímea Dr.,⁽¹⁾ Pánczél Pál Prof. Dr.,⁽¹⁾ Hosszúfalusi Nóra Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Amikor a diabetes 17 év utáni reklasszifikációja inzulinkezelés leállításához, eredményesebb kezeléshez vezet. A személyre szabott kezelés eredményessége, költséghatékonysága, tanulságai

Veres Dóra Eszter Dr.,⁽¹⁾ Gincsei Ildikó Dr.,⁽²⁾ Demeter Annamária Dr.,⁽¹⁾ Molnár Márta Dr.,⁽¹⁾ Papp Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Szfárlí Enikő Dr.,⁽¹⁾ Balogh István Dr.,⁽³⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Jósa András Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza, IV. Belgyógyászat, ²Nyírbátor Diabétesz szakrendelés, ³Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Genetika Tanszék

09:30 – 11:00 Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. szimpózium

„Rejtőzködő” társbetegségek a pre(diabetes) mögött

Üléselnök: Dr. Tabák Gy. Ádám

Mikor vagy hogyan lesz a prediabetesből diabetes

Dr. Rosta László

CV rizikók a prediabetes és 2-es típusú diabetes hátterében

Dr. Nagy Viktor

Pajzsmirigy eltérések és a diabetes összefüggései

Dr. Putz Zsuzsanna

ED, avagy a diabetes árnyoldala

Dr. Hermányi Zsolt

Szakmai vita

13:00 – 14:00 *Ebéd*

14:00 – 15:00 Lilly Hungária Kft. szimpózium II.

Tartsa Kézben Cukorbetegségét – avagy az önmenedzselés mint a sikeres terápia sine qua non-ja

Kerekasztalvezető: Dr. Fövényi József

A kerekasztal szakértői:

Dr. Földesi Irén

Dr. Gaál Zsolt

Kicsák Marian

20:00 – *Vacsora (Fehértói Halászcserda)*

2018. ÁPRILIS 21., SZOMBAT – C SZEKCIÓ

08:15 – 09:30 SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ

Üléselnökök: Dr. Halmos Tamásné, Dr. Nádas Judit

2-es típusú cukorbetegséggel élők általános ismeretei a diabéteszről

Kicsák Marian,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Lukács Andrea PhD.,⁽²⁾

¹Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászati Osztály, Nyíregyháza, ²Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc

A szabadidő-sport dietoterápiája diabéteszben

Gordos Lívia,^(1,2)

¹Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján, ²Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék - óraadó, Budapest

Életminőség elemzése objektív mutatók segítségével

Schrobár Ágnes,⁽¹⁾ Barna T. Katalin Dr.,⁽¹⁾ Szlatinszki Nóra,⁽¹⁾ Parrag József Dr.,⁽²⁾

¹SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium, ²Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztály

A 2-es típusú cukorbetegség tápláltsági állapotának, testösszetételének és étkezési szokásainak felmérése

Csikós Ágnes,⁽¹⁾ Hosszúfalusi Nóra Dr.,⁽¹⁾ Baló Tímea Dr.,⁽¹⁾ Lukács Krisztina Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Az osteoporosis és a diabétesz korunk „néma járványa”

Molnár Antalné,⁽¹⁾

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Anyagcsere Betegségek Tanszék, Debrecen

13:00 – 14:00 *Ebéd*

20:00 – *Vacsora (Fehértói Halászcserda)*

2018. ÁPRILIS 22., VASÁRNAP – KONGRESSZUSI TEREM

08:15 – 09:30 A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES KEZELÉSE*Üléselnökök: Dr. Földesi Irén, Prof. Dr. Lengyel Csaba***Cukorbetegek egyéni HBA1c céltartományának meghatározásában észlelhető eltérések az orvosi gyakorlatban***Rinfel József Dr., ⁽¹⁾ Oláh Ilona Dr., ⁽²⁾ Wittmann István Prof. Dr., ⁽³⁾**¹PTE-ÁOK Alapellátási Intézet, ²MDT Háziorvosi Munkacsoport, ³PTE-ÁOK II. sz. Belgy.Klinika***Kettős és hármas kombinációban alkalmazott SGLT2 gátló és DPP-4 gátló kezelés hatékonyságának és biztonságosságának összehasonlítása a mindennapi gyakorlatban***Nyitrai Ferenc Dr., ⁽¹⁾ Bótyik Balázs Dr., ⁽¹⁾ Taybani Zoltán Dr., ⁽¹⁾ Katkó Mónika ⁽²⁾**¹Békés Megyei Központi Kórház – Dr. Réthy Pál Tagkórház, III. sz. Belgyógyászat, I. sz. Endokrinológiai Osztály, ²Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara, Belgyógyászati Intézet***A liraglutid csökkenti az albuminuriát 2-es típusú cukorbetegekben és kedvezőnek tűnik nem-alkoholos májbetegségben is***Brasnyó Pál Dr., ⁽¹⁾ Molnár Márta Dr., ⁽²⁾ Pintér István Dr., ⁽¹⁾**¹Siófoki Kórház, Belgyógyászati Osztály, ²FMC Dialízis Központ Szigetvár***A különböző adherencia-típusok összefüggése 2-es típusú diabéteszes betegeknél***Klinovszky Andrea, ⁽¹⁾ Kiss István M., ⁽¹⁾ Papp-Zipernovszky Orsolya PhD., ⁽²⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr., ⁽³⁾ Buzás Norbert PhD., ⁽¹⁾**¹SZTE ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet, Szeged, ²SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, ³SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged***Mekkora hatása lehet az életmódnak egy polimorbid beteg inzulin igényére?***Kósa István PhD., ^(1,2) Schumacher Edit Dr., ⁽¹⁾ Szálka Brigitta, ⁽¹⁾ Havasi Anett Dr., ⁽³⁾ Kohut László PhD., ⁽¹⁾*

¹MH-EK Honvédkórház Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, Balatonfüred,
²Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina tanszék Szegedi Tudományegye-
 tem Általános Orvostudományi Kar, ³Vanderlich Egészségcentrum, Veszprém

09:30 – 10:00 *Szünet*

10:00 – 11:15 **EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓ**

Üléselnökök: Dr. Baranyi Éva, Dr. Tabák Gy. Ádám

„Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 (MAESZ)”. A 2010-2016 eredményei

*Barna István Dr., ⁽¹⁾ Kékes Ede Prof., ⁽²⁾ Daiki Tenno, ⁽³⁾ Dankovics Ger-
 gely, ⁽⁴⁾ Kiss István Prof., ⁽⁵⁾*

¹Semmelweis Egyetem, ÁOK, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest; ²Prémi-
 um Diet, Budapest; ³ELTE, Media és Oktatásinformatikai Tanszék, Budapest;
⁴MAÁESZ Programbizottság tagja, Budapest; ⁵Semmelweis Egyetem, ÁOK,
 Geriátriai Tanszéki Csoport, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrolo-
 gia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Részleg, Budapest

**A cukorbetegség depressziójának és szorongásának szűrése az alap-
 ellátásban**

*Hargittay Csenge Dr., ⁽¹⁾ Becze Ádám Dr., ⁽¹⁾ Eöry Ajándék PhD., ⁽¹⁾
 Gonda Xénia PhD., ⁽²⁾ Rihmer Zoltán Prof. Dr., ⁽²⁾ Kalabay László Prof.
 Dr., ⁽¹⁾ Torzsa Péter PhD., ⁽¹⁾*

¹Semmelweis Egyetem ÁOK, Családorvosi Tanszék, ²Semmelweis Egyetem
 ÁOK, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

**A várandóssági cukorbetegség előfordulása napjainkban Tolna me-
 gyében**

*Kun Attila PhD., ⁽¹⁾ Tornóczky János Dr., ⁽²⁾ Kerényi Zsuzsanna PhD., ⁽³⁾
 Tabák Gy. Ádám Dr., ^(4, 5)*

¹Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Szek-
 szárd, ²Tolna Megyei Balassa János Kórház, Megyei Diabétesz Gondozó, Szek-
 szárd, ³Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Diabetológiai Szakrendelés, Csepel,
⁴Semmelweis Egyetem ÁOK, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Diabétesz Rész-
 leg, Budapest, ⁵University College London Epidemiológiai és Népegészségtani
 Tanszék, London, Egyesült Királyság

A magyar monogén diabetes regiszter adatainak elemzése különös tekintettel a GCK-MODY esetekre

Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Kántor Irén Dr.,⁽²⁾ Papp Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Veres Dóra Eszter Dr.,⁽¹⁾ Balogh István Dr.,⁽³⁾

¹Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza IV Belgyógyászat, ²Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály, ³Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Genetikai Tanszék

Diabetológiai telemonitorozás és távkonzultáció az AEEK EFOP 1.9.6 projektjében

Kósa István Dr.,⁽¹⁾ Lengyel Csaba Prof. Dr.,⁽²⁾

¹Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, ²Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika

11:15 – 11:30 *Szünet*

11:30 – 12:30 **DIABETESHEZ TÁRSULÓ KÓRÁLLAPOTOK II.**

Üléselnökök: Dr. Holzinger Gábor, Dr. Taybani Zoltán

Genetikai tényezők szerepe a metabolikusan aktív és kevésbé aktív NAFLD-ben, valamint a hasnyálmirigy lipid-akkumuláció jelentősége

Nádasdi Ákos Dr.,⁽¹⁾ Gál Viktor Dr.,⁽²⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾ Firneisz Gábor Dr.,⁽³⁾

¹Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika, ²MTA TTK Természet-tudományi Kutatóközpont Agyi Képzőközpont, ³MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport

Diabetes kezelése daganatos betegeknél – kérdések és problémák

Gulácsi-Bárdos Petra Dr.,⁽¹⁾

¹Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet, Belgyógyászat - Diabetológia, Dunakeszi

A 2-es típusú diabetes és a thrombocytosis túlélésre gyakorolt hatása colorectalis daganatokban

Herold Zoltán,⁽¹⁾ Herold Magdolna,⁽¹⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

A MASP3 komplement fehérje emelkedett plazmakoncentrációja 2-es típusú cukorbetegség esetén bakteriális fertőzés jelenlétében és hiányában

Barkai László József Dr.,⁽¹⁾ Sipter Emese Dr.,⁽¹⁾ Csuka Dorottya Dr.,⁽¹⁾ Lukács Krisztina Dr.,⁽¹⁾ Prohászka Zoltán Prof. Dr.,⁽¹⁾ Karádi István Prof. Dr.,⁽¹⁾ Pánczél Pál Prof. Dr.,⁽¹⁾ Hosszúfalusi Nóra Dr.,⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika

12:30 – 13:00 Kongresszus zárása

13:00 – 13:30 *Ebéd*

2018. ÁPRILIS 22., VASÁRNAP – B SZEKCIÓ

08:15 – 09:30 GYERMEKDIABETES – MDT Gyermekegészségügyi Szekció programja

Üléselnökök: Dr. Körner Anna, Prof. Dr. Barkai László

1-es típusú diabéteszes kisgyermek hatása a családra

Lukács Andrea PhD.,⁽¹⁾ Bartkóné Kovács Anett,⁽²⁾ Barkai László Prof. Dr.,^(1,3)

¹Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományok Intézete, Miskolc, ²Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc, ³Kassai Safarik Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekegészségügyi Klinika, Kassa

A diabéteszes gyermek átadása a gyermekgondozásból a felnőtt ellátásba

Fürst Ágnes Dr.,⁽¹⁾ Strényer Ferenc Dr.,⁽¹⁾

¹Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Gyermekegészségügy a felnőttkorban – A gyakorló szemüvegén át

Berényi Zsuzsanna Dr.,⁽¹⁾ Hósi Mária Dr.,⁽¹⁾

¹CSMEK Hódmezővásárhely

Monogénese diabetesek a gyermekellátásban

Kántor Irén Dr.,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽²⁾ Balogh István Dr.,⁽¹⁾

¹Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza, ²Jósa András Oktatókórház, IV. Belgyógyászat, Nyíregyháza, ³Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Genetikai Tanszék

Periferiás szenzoros neuropátia szűrése Q-Sense* készülékkel diabeteses gyermekekben és ifjakban

Blatniczky László Dr.,⁽¹⁾ Szabó Gabriella,⁽¹⁾

¹Szent János Kórház Gyermekdiabétesz Ellátás, Budapest

09:30 – 10:00 *Szünet*

10:00 – 11:15 **DIABETES LÁB**

Üléselnökök: Dr. Oláh Ilona, Dr. Kajetán Miklós

Egy beteg, három seb, több tanulság – I.

Kajetán Miklós Dr.,^(1,3) Farkas Klára PhD.,⁽²⁾

¹Bajcsy-Zsilinszky Kórház Diabétesz Láb Szakrendelés, ²Bajcsy-Zsilinszky Kórház Angiológiai Szakrendelés, ³Strázsahegy Medicina Háziorvosi Rendelő

Egy beteg, három seb, több tanulság – II.

Farkas Klára Dr.,⁽¹⁾ Kajetán Miklós Dr.,^(2,3) Jermendy György Prof. Dr.,⁽¹⁾ Hermányi Zsolt Dr.,⁽¹⁾

¹Angiológia-Diabetológia - III. Belgyógyászati Osztály, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ²Diabétesz Láb Ambulancia, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, ³Strázsahegy Medicina Háziorvosi Rendelő, Budapest

A Jósa András Oktatókórházban 2011-2016 között végzett diabetes láb miatti minor és majoramputációk elemzése

Molnár Márta Dr.,⁽¹⁾ Móricz István Dr.,⁽¹⁾ Veres Dóra Eszter Dr.,⁽¹⁾ Demeter Annamária Dr.,⁽¹⁾ Biriné Mika Borbála,⁽¹⁾ Papp Szuszsanna Dr.,⁽¹⁾ Gaál Zsolt Dr.,⁽¹⁾ Gincsei Ildikó Dr.,⁽²⁾ Szilassy Géza Dr.,⁽³⁾ Tóth Lajos Barna Dr.,⁽⁴⁾

¹Jósa András Egyetemi Oktatókórház IV Belgyógyászat, Nyíregyháza, ² Nyírbátor Diabétesz Szakrendelés, Nyírbátor, ³Jósa András Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztály, Nyíregyháza, ⁴Jósa András Egyetemi Oktatókórház Sebészeti Osztály, Nyíregyháza

A diabeteses láb ambulancia első éve podiáter szemmel

Biriné Mika Borbála, ⁽¹⁾ *Gaál Zsolt Dr.,* ⁽¹⁾ *Molnár Márta Dr.,* ⁽¹⁾ *Móricz István Dr.,* ⁽¹⁾ *Szűfárlí Enikő Dr.,* ⁽¹⁾ *Fekete Ágnes Dr.,* ⁽¹⁾

¹Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház

Törekvés az alsó végtagi amputációk elkerülésére kerületünkben

Oláh Ilona Dr., ⁽¹⁾ *Illés Krisztina Dr.,* ⁽¹⁾ *Iller Barbara Dr.,* ⁽²⁾ *Fejes Zsuzsanna Dr.,* ⁽¹⁾ *Vörös Krisztián Dr.,* ⁽²⁾

¹Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Budapest-Csepel, ²Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest

11:15 – 11:30 *Szünet*

11:30 – 12:30 ÖNELLENŐRZÉS, TERÁPIA

Üléselnökök: Dr. Blatniczky László, Dr. Kocsis Győző

A prim-A-port készülékTM alkalmazása az 1-es típusú diabetesz kezelésekor

Piros Éva Anna, ⁽¹⁾ *Piros Zoltán Dr.,* ⁽²⁾ *Herényi Levente PhD.,* ⁽³⁾ *Kautzky László PhD.,* ⁽⁴⁾

¹Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, ²Bőrgyógyászati Magánrendelő, Budapest, ³Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Budapest, ⁴Budai Irgalmasrendi Kórház Diabetológia, Budapest

Elektronikus vércukornapló használata a mindennapi gyakorlatban

Veres Agneta Dr., ⁽¹⁾ *Bótyik Balázs Dr.,* ⁽¹⁾ *Taybani Zoltán Dr.,* ⁽¹⁾

¹BMKK - Dr. Réthy Pál Tagkórház, III. Belgyógyászat - I. Endokrinológia Osztály

Elektronikus adatkezelő programok és mobil alkalmazások használata cukorbeteg körében

Bibok György Dr., ⁽¹⁾ *Tabák Gy. Ádám Dr.,* ^(1, 2) *Horváth Viktor Dr.,* ^(1, 2)

¹Nemzeti Cukorbeteg Alapítvány, ²Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Ki tanult többet? Retrospektív monitorizálás egy eset kapcsán.

Hocsi Mária Dr.,⁽¹⁾

¹CSMEK Hódmezővásárhely

13:00 – 13:30 *Ebéd*

2018. ÁPRILIS 22., VASÁRNAP – C SZEKCIÓ

08:30 – 09:30 DIABETESHEZ TÁRSULÓ KÓRÁLLAPOTOK I.

Üléselnökök: Dr. Rosta László, Dr. Molnár Gergő Attila

Chorioidea vastagságának változása diabeteses retinopathiában

Horváth Hajnalka Dr.,⁽¹⁾ Ecsedy Mónika Dr.,⁽¹⁾ Sándor Gábor Dr.,⁽¹⁾ Kovács Illés Dr.,⁽¹⁾ Nagy Zoltán Zsolt Prof. Dr.,⁽¹⁾ Somogyi Anikó Prof. Dr.,⁽²⁾

¹Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest, ²Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Neuropátiás panaszok mögött meghúzódó, nem ismert diabetes mellitus a kockázatalapú szűrés bevezetése előtt egy háziiorvosi körzetben

Horváth Krisztina Dr.,⁽¹⁾ Kovács Norbert Dr.,^(1,2)

¹Neurology Egészségügyi Kft, ²PTE KK Neurológiai Klinika

A Buschke-féle scleroedema klinikai jelentősége diabetes mellitusban

Bódis Beáta Dr.,⁽¹⁾ Csonka Viktória Dr.,⁽²⁾ Farkas Nelli Dr.,⁽²⁾ Kovács Dániel Dr.,⁽²⁾ Gábris Boglárka Dr.,⁽²⁾ Kálmán Endre Dr.,⁽³⁾ Czirják László Prof. Dr.,⁽²⁾ Varjú Cecília Dr.,⁽²⁾

¹PTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Pécs, ²PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinika, Pécs, ³PTE Pathológiai Intézet, Pécs

Madridi konszenzus - cukorbeteg páciensek fogászati ellátásának alapelvei

Végh Dániel Dr.,⁽¹⁾ Bányai Dorottya Dr.,⁽²⁾ Végh Ádám,⁽⁴⁾ Hermann Péter Prof. Dr.,⁽¹⁾ Ujjál Márta Dr.,⁽³⁾

¹Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika, ²Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, ³Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, ⁴Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar

09:30 – 10:00 *Szünet*

10:00 – 11:30 **EXPERIMENTÁLIS TANULMÁNYOK**

Üléselnökök: Prof. Dr. Somogyi Anikó, Prof. Dr. Pogátsa Gábor

A RAAS-gátlók új terápiás lehetőségei diabéteszhez társuló depresszióban

Lénárt Lilla PhD., ⁽¹⁾ Balogh Dóra Bianka, ⁽¹⁾ Hodrea Judit PhD., ⁽¹⁾ Bárczi Adrienn Dr., ⁽¹⁾ Hosszú Ádám PhD., ^(1, 3) Molnár Ágnes Dr., ⁽¹⁾ Szkibinszkij Edgár, ⁽¹⁾ Vannay Ádám Dr., ⁽²⁾ Wagner László Dr., ⁽³⁾ Szabó Attila József Prof. Dr., ^(2, 4) Fekete Andrea Dr., ^(1, 4)

¹MTA-SE „Lendület” Diabétesz Kutatócsoport, Budapest, ²MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, Budapest, ³SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest, ⁴SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A tubulusok újra felfedezett szerepe a diabéteszes nefropátia patogenezisében

Körner Anna Dr., ⁽¹⁾

¹Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika

A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer gátlók csökkentik a hiperglikémia indukálta tubulointersticiális fibrózist diabéteszes vesebetegségben

Molnár Ágnes, ⁽¹⁾ Kőszegi Sándor, ⁽¹⁾ Lénárt Lilla, ⁽¹⁾ Hodrea Judit, ⁽¹⁾ Balogh Dóra Bianka, ⁽¹⁾ Szkibinszkij Edgár, ^(1, 2) Wagner László, ⁽²⁾ Vannay Ádám, ⁽³⁾ Fekete Andrea, ^(1, 4)

¹MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport, Budapest, ²SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest, ³MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, Budapest, ⁴SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Az SGLT2 gátlók renoprotektív hatása mögött húzóóó új molekúlaris mechanizmus: a tubúlaris hipoxia és a fehérje O-GlcNAcíláció csóókkentése

Balogh Dóra Bianka,⁽¹⁾ Hodrea Judit,⁽¹⁾ Lénárt Lilla,⁽¹⁾ Hosszú Ádám,^(1, 3) Mezei Csenge,⁽¹⁾ Vannay Ádám,⁽²⁾ Wagner László,⁽³⁾ Szabó Attila József,^(2, 4) Fekete Andrea,^(1, 4)

¹MTA-SE „Lendület” Diabétesz Kutatócsóport, ²MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiái Kutatócsóport, ³Semmelweis Egyetem Transzplantációó és Sebészeti Klinika, ⁴Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

SGLT2 gátló dapagliflozin kardiovaszkuláris hatása 1-es típusú diabétesz állatmodelljében

Bárczi Adrienn,⁽¹⁾ Balogh Dóra Bianka,⁽¹⁾ Lénárt Lilla,⁽¹⁾ Molnár Ágnes,⁽¹⁾ Hosszú Ádám,^(1, 4) Nádasz György,⁽³⁾ Reusz György,⁽²⁾ Fekete Andrea,⁽¹⁾

¹SE-MTA „Lendület” Diabétesz Kutatócsóport, ²Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, ³Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, ⁴Semmelweis Egyetem, Transzplantációó és Sebészeti Klinika

A diabétesz bélszakasz-specifikus módon befolyásolja a hemoxigenáz rendszert az enterális neuronokban

Bagyánszki Mária PhD.,⁽¹⁾ Chandrakumar Lalitha,⁽¹⁾ Szalai Zita PhD.,⁽¹⁾ Mezei Diána,⁽¹⁾ Márton Zsuzsanna,⁽¹⁾ Bódi Nikolett PhD.,⁽¹⁾

¹Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Szeged

13:00 – 13:30 *Ebéd*

Kezdje a napot a kék MÉRY-vel!



MÉRY /kék 800



Di-Care Zrt.,

1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
www.merykek.hu, www.dicare.hu

Csak MÉRY /kék tesztsíkkal használható!
www.cukorbetegvagyok.hu

A MÉRY KÉK 800 vércukorszintmérő készülék gyógyászati segédeszköz.
A kockázatokról olvassa el a kezelési útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Pontosság kedvező áron!

Ajánlja Ön is a megbízható
ACCU-CHEK® Performa
termékcsaládot inzulinnal kezelt
cukorbetegjei részére!

Ajánlott bruttó fogyasztói ár:

7.990 Ft

TB támogatás esetén bruttó:

541 Ft

Közfogyellátásban kiszolgálhatót!



Vegye át
legújabb
információs
anyagunkat
a hirdetés
bemutatásával!

Bővebb információ: www.vercukormeres.hu
06 (80) 200-694

Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.

ACCU-CHEK®

A MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG TÁMOGATÓI

PLATINA FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



77 Elektronika Kft.



Lilly Hungária Kft.

GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓK




AstraZeneca Kft.



A MÉRÝ termékek forgalmazója

Di-Care Zrt.

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



A MDT2018 KONGRESSZUS TOVÁBBI TÁMOGATÓI

Szeged Város

A KONGRESSZUS EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓI



A KONGRESSZUS BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓJA



A KONGRESSZUS TOVÁBBI TÁMOGATÓI



Napi 1x Xultophy®▼¹

Egy lépésben

előbbre jut

ÚJ ADATOK
DUAL VII

Bizonyított előnyökkel vs. bázis-bólus kezelés:^{2*}

- Hasonló HbA_{1c} csökkenés¹ (1,5%) 44 egységgel kevesebb inzulinnal és napi egy injekcióval^{1,2*}
- Szuperior testsúlycsökkenés 3,6 kg előnnyel^{2S}
- 89%-kal kevesebb hipoglikémia gyakoriság^{2**}

Glarginnal (100 E/ml) nem megfelelően kontrollált 2-es típusú diabéteszes betegeknél.²



Gyyszerű intenzifikálás degludek és liraglutid kombinációval 1 tollban.²

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.

*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.

Egy előretöltött injekciós toll 3 ml oldatot tartalmaz, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak.

Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat.

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<http://www.ema.europa.eu> → Find medicine → X → Xultophy* → Product information → HU = magyar** → GO

*Lapozni a jobb alsó sarokban lehet. ** Kiválasztás az első lenyíló listában.

Megjegyzés: a QR kód a termék kezdetétől szerinti lista első oldalára mutat.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 40 315 Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 12 094 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 2018. február 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszerszár.

A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.

© 2018 Novo Nordisk A/S

*Glargin (100 E/ml) + aszpirt akár napi négy alkalommal²

¹Becsült kezelési különbség a vizsgálat végén: -0,02%. Non-inferioritás akkor igazolódott, ha a HbA_{1c} kiindulástól való eltéréseben a kezelések közötti becslát átlagos különbség kétoldali 95%-os konfidencia intervallumának felső határa <0,3% volt.²

²A Xultophy® adaga a vizsgálat végén: 40 adagolási egység (40 egység degludek + 1,44 mg liraglutid) vs. 84 egység inzulin (52 egység bázis inzulin és 32 egység bólus inzulin); p<0,0001²

²Becsült kezelési különbség -3,6 kg (p<0,0001) kiinduláshoz mért testsúlyváltozás tekintetében a vizsgálat végére.²

^{**}Becsült eseményméret a vizsgálat végén 0,11 (95% CI: 0,08-0,17; p<0,0001) Az összes hipoglikémia meghatározása: súlyos (másik személy segítségét igénylő) vagy vércukormértéssel igazolt (< 3,1 mmol/l) hipoglikémias esemény hipoglikémiának megfelelő tünetekkel.²

Referencia

¹ Xultophy® alkalmazási előírás (szövegellenőrzés dátuma 2017. október) ² Billings LK, Doshi A, Gouet D, et al. Efficacy and safety of insulin degludec/liraglutide (IDegLira) vs basal-bolus therapy in patients with type 2 diabetes: DUAL VII trial. Annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Lisbon, Portugal; September 2017: Poster 796.



Novo Nordisk Hungária Kft.

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.

Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu

Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

Xultophy®
degludek inzulin / liraglutid injekció



HbA_{1c} CÉL ELÉRÉSE:

- **Hatékony HbA_{1c} csökkentés ultrahosszú hatástartammal¹**
- **Alacsonyabb hipoglikémia kockázattal vs. glargin (100 E/ml)¹**
- **Szükség esetén rugalmasság a beadás időzítésében¹**
...napi egyszeri adagolással.

7.0%



A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETTEL: Egy előretöltött injekciós toll 300 egység degludek inzulint tartalmaz 3 ml oldatban. 1 ml oldat 100 egység degludek inzulint tartalmaz* (egyenértékű 3,66 mg degludek inzulinnal).

* Rekombináns DNS technológiával *Saccharomyces cerevisiae*-ben állítják elő.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch®). Tiszta, színtelen, semleges oldat.

A készítmény rendelése előtt kérjük olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<http://www.ema.europa.eu> -> Find medicine -> Human medicines -> T-> Tresiba* -> Product information -> HU = magyar** -> GO

*Lapozni a jobb alsó sarkokban lehet.

**Kiválasztás az első lenyíló listában.

Megjegyzés: a QR kód a termék kezdőbetűje szerinti lista első oldalára mutat.

Feltételezett mellékhatások bejelentése:

A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

Támogatással és árral, valamint rendelkezéssel kapcsolatos információk:

A Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása:

„I” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (5 x 3ml) bruttó fogyasztói ára: 21 813 Ft,

Tb-támogatás: 21 513 Ft, térítési díj: 300 Ft Eü 100% 3. rendelés esetén.

Tb-támogatás: 10 907 Ft, térítési díj: 10 906 Ft Eü 50% 6/a, 6/d rendelés esetén.

2018. március 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszerszámok.

A Tresiba® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2018 Novo Nordisk A/S

Referencia: 1. Tresiba® alkalmazási előírás (szöveggellenőrzés dátuma: 2018. február)



Novo Nordisk Hungária Kft.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

TRESIBA®
degludek inzulin