



FIATAL DIABETOLOGUSOK FÓRUMA

AZ MDT TOVÁBBKÉPZŐ RENDEZVÉNYE

DE LEARNING CENTER, DEBRECEN

2026. FEBRUÁR 20-21.

PROGRAM

ÉRJÜK EL EGYÜTT A TERÁPIÁS CÉLOKAT MOUNJARO-VAL¹



A MOUNJARO HATÉKONYAN CSÖKKENTI A TESTTÖMEGET^{1,2}



GIP domináns kettős receptoragonista hatás-mechanizmus¹:

Az **első és egyetlen** terápia, amely a **GIP-** és a **GLP-1** receptorokat egyaránt aktiválva hat az elhízás patofiziológiájára.^{1,7,8}



Jelentős testtömegcsökkenés:

Már a **Mounjaro 5 mg** dózis átlagosan **16% testtömegcsökkenést** eredményezett. A terápia személyre szabható: **akár 22,5%-os testtömegcsökkenés is elérhető.**^{1,*}



Javuló kardiometabolikus paraméterek, amint az **LDH-tól a vérnyomás, a haskőrfogat, a triglicerid-, HDL-koleszterin és LDL-koleszterin értékek** változásából.^{1-6†}

***A Mounjaro a testtömeg kontrollálá-sához – beleértve a testtömeg csökkentését és a testtömeg fenntartá-sát is – kiegészítő kezelésként szolgál a csökkentett kalóriatartalmú étrend és a fokozott fizikai aktivitás mellett, olyan felnőttek számára, akiknek a kezdeti testtömegindexe (Body Mass Index, BMI)**

- $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (elhízás), vagy
- $\geq 27 \text{ kg/m}^2$, de $< 30 \text{ kg/m}^2$ (túlsúly), és akiknél legalább egy test-tömeggel összefüggő társbetegség (pl. hipertónia, diszlipidémia, obstruktív alvási apnoe szindróma kardiiovaszkuláris betegség, prediabetes vagy 2-es típusú diabetes mellitus) is fennáll.¹

A Mounjaro 2-es típusú diabetesben szenvedő felnőttek kezelésére is javallott: lásd Alkalmazási előírás "4.1 Terápiás javallatok" pontja.¹

A már forgalomban lévő hatáserőségek mellett **2025. júliustól Magyarországon is elérhető a gyógyszer-tárakban a Mounjaro KwipPen 12,5 mg/adagos és 15 mg/adagos hatáserőségei.**

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsek bármilyen feltételezett mellékhatást.

BMI=testtömegindex; GIP=glükagoninszerű inzulinotróp polipeptid; GLP-1=glükagoninszerű peptid-1; HDL=magas densitású lipoprotein; LDL=alacsony densitású lipoprotein

¹A SURMOUNT-1 vizsgálatban 15 mg Mounjaro (tirzepatid) (n=630) mellett -23,6 kg (-22,5%) volt az átlagos testtömegcsökkenés a 72. héten, míg placebo (n=643) mellett -2,4 kg (-2,4%) (p<0,001 mind a kg-ban, mind a %-ban mért különbségre nézve). A kezeléseket csökkentett kalóriatartalmú étrend és fokozott fizikai aktivitás mellett alkalmazták.¹ Hatáserőségi becslés, MMRM (ismételt mérések kevert modell) elemzés, MITT (modosított intent-to-treat [kezelti szándékozott]) populáció.¹ Az egyes dózisok hatáserőségi becslését nem korrigálták multiplicitásra, kivéve a haskőrfogatot a 10 és 15 mg esetén.¹

²A Mounjaro terápia javallatát között nem szerepel a kardiometabolikus kockázati tényezők javítása. A kardiometabolikus paramétereket a SURMOUNT-1 vizsgálatban - hasonlóan a SURMOUNT-2, -3, -4 vizsgálatokhoz - másodlagos végpontként értékelték.^{1,4,6}

³Hivatkozások: 1. Mounjaro Alkalmazási előírás; 2. Al Zewahry A M Cures 2024; 16(12):51788. DOI: 10.7555/Cures.51788.3; Jastreboff et al. N Engl J Med. 2023;387(3):205-216; 4. Garvey et al. Lancet 2023; 402: 613-26; 5. Wadden et al. Nature Medicine 2023; 29:2909-2918; 6. Aronne et al. JAMA. 2024;331(1):38-48; 7. Melson et al. Int J Obes (2024). <https://doi.org/10.1038/s41366-024-01473-y>.

Nemkívánatos esemény, mellékhatás vagy termékpanasz bejelentése: (1) 328 5151, adverzeset_hungary@lilly.com vagy közvetlenül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részére: H-1372 Budapest, Postafiók 450, adrbbox@nngyk.gov.hu, <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu>



Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg / 12,5 mg / 15 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban; Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg / 12,5 mg / 15 mg oldatos injekció injekciós üvegben; Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg/adagos / 7,5 mg/adagos / 10 mg/adagos / 12,5 mg/adagos / 15 mg/adagos KwipPen oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

Bővebb információt olvasson el a **gyógyszer alkalmazási előírását** a hatályos "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatabazis/) vagy az Európai Gyógyszerügylet (www.ema.europa.eu/) honlapokon. ÖÖEÍ honlapon keresztül történő elérésű alábbi www.ogyei.gov.hu/Adatbazisnyilvantartaski Gyógyszer-adatbázis; szabadszavas keresésben a „MOUNJARO” megadása, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, EMA ikon vagy hiperlinke történő kattintás.

https://www.ema.europa.eu/hu/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information_hu.pdf

Gyógyszer ára, társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke: A készítmény a társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a NEAK Publikus Gyógyszerszámítást: https://www.neak.gov.hu/felso_menu/szolnaki_didallak/gyogyszer_jegeteszkoz_gyogyszer_furdo_tamogatasi_jegeteszkoz_vallokozasiak/pupha/Vegleges_PUPHA.

Kiadathoz: orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

PR-HU-0201 A dokumentum lezárásának dátuma: 2025.07.29.

Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Masfiek Imre út 13-14.

Tel: (1) 328 5100 Fax: (1) 328 5101 www.lilly.com/hu

© 2025 Eli Lilly and Company. Minden jog fenntartva.

Lilly

Lipodisztrófia:

EGY SOKARCÚ heterogén kórkép¹

 **Chiesi**



**A lipodisztrófia kezelésében
a MYALEPTA® egy összetett,
specifikus leptinpótló megoldás**


myalepta®
metreleptin

▼ Ezt a gyógyszert további ellenőrzésnek kell alávetni. Ez lehetővé teszi az új biztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kéri, hogy jelentsék a gyanús mellékhatásokat a következő elérhetőségeken: pv.global@exceedorphan.com.



Referencia: 1. Baris Akinci et al., Comorbidities and Survival in Patients With Lipodystrophy: An International Chart Review Study. (J Clin Endocrinol Metab 104: 5120–5135, 2019)

Az alkalmazási előírat eléréséhez olvassa le a QR-kódot.
EO-MYA-HU-01-2026

Kereskedelmi Partner: **ExCEED Orphan s.r.o.**
Bucharova 2657/12, 158 00 | Prague 5 | Czech Republic
info@exceedorphan.com

👥 SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Harangi Mariann
Dr. Sztanek Ferenc

📍 HELYSZÍN

DE Learning Center, Debrecen
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

🏢 KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA**STAND-ART Event Management**

6723 Szeged, Tisza Palota H/17. • Felső Tisza-part 31-34.

Tel: +36 62 999 950 • Fax: +36 62 661 331

E-mail: info@stand-art.hu

Számlacím: 6723 Szeged, Felső Tisza- part 31-34. H. ép. Fsz. 17. ajtó

Dr. Bernáth József, ügyvezető

E-mail: joe@stand-art.hu

Dr. Garhuth Anita, project manager (regisztráció, szponzori támogatások, kiállítás)

E-mail: anita@stand-art.hu

Jakab Laura, ügyvezető

E-mail: laura@stand-art.hu

Lacsán Dóra, ügyvezető

E-mail: dora@stand-art.hu

Lacsán Lili, project manager (számlázás és pénzügyek)

E-mail: lili@stand-art.hu

🏢 KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ

Február 20-án 08.00 - 17.50

Február 21-én 09.00 - 12.20

📞 Regisztrációs iroda telefonszáma

+36 30 619 7348

A KONGRESSZUS HONLAPJA:

<https://stand-art.hu/FDF2026>

SAKADOLGOZÓI PONTOK JÓVÁÍRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK REGISZTRÁCIÓJA:

<https://stand-art.hu/urlop/FDF2026-Szakdolgozoi-urlop>

FDF 2026 REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

	Korai regisztrációs díj 2026. február 2-ig	Regisztrációs díj 2026. február 2 után
MDT 45 év alatti aktív tagjai számára (pályázat beküldése esetén)	0 Ft	0 Ft
Minden más MDT és nem MDT tag résztvevő számára egyégesen	45 000 Ft	50 000 Ft

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, pénteki ebéd és vacsora, kitűző, konferencia mappa a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, tanfolyamzáró teszt, akkreditáció díja valamint tartalmazza a mindenkor ÁFA összegét is. A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 15.000 Ft/nap. A regisztrációs díj kiállítók/céggépviselők kivételével továbbá tartalmaz 2 db közlekedési napijegyet a rendezvény idejére.

A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a továbbképzés végéig, legkésőbb 2026. február 21-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a változatlan formában továbbszámolt közvetített szolgáltatásokat.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2026. január 20-ig van lehetőség, azt követően a díjak kiszámlázásra kerülnek a kötbéres szerződések miatt. Rendezvényt követően kiállított végszámlákat – Résztevő/Díjfizető kérésére – stornózni, és új számlát kiállítani a mindenkorai önrevízió költségének Résztevő/Díjfizető általi megfizetése ellenében van lehetőség. Számla költségtérítés nélküli stornózására és új számla kiállítására kizárólag a Szolgáltató adminisztrációs hibájából adódóan kiállított számlák esetében van lehetőség.

A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek bevonásával, közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat.

A KONGRESSZUS HIVATALOS NYELVE

magyar

KONGRESSZUSI KITÜZŐK

A kongresszusi előadások és a kiállítás csak kitűzővel látogathatók.

INTERNET

Hálózat neve: LC-Konferencia

Jelszó: Unideb2026

ELŐADÁSOK ANYAGÁNAK LEADÁSA ÉS FELTÖLTÉSE

Kérünk minden előadót, hogy szíveskedjen a prezentáció anyagát min. 3 órával az előadás időpontja előtt leadni a technikusoknak. A reggeli előadásokat kérjük, hogy lehetőség szerint előző nap legyenek szívesek leadni.

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

A szálláshelyek foglalása egyénileg történik. Ajánlásokat a kongresszus honlapján találhatnak:

<https://stand-art.hu/FDF2026>

PARKOLÁS

A Learning Center környező utcáiban fizetős a parkolás. Zöld zónába tartozik, Zónakódja: 4033.


Az épület közvetlen közelében lehetőség van kedvezményes napije-
gyes parkolás igénybevételére 2500 Ft/nap/gépkocsi díj ellenében.
Ennek igénybevételéről érdeklődjenek a Stand-Art regisztrációs asz-
talanál.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, beteg-
ség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmi-
lyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

AKKREDITÁCIÓ

A rendezvény belgyógyász, diabetológus, dietetikus, endokrinológus
és anyagcsere-betegségek, gasztroenterológia számára hivatalos,
pontszerző továbbképző oktatási program. A regisztrált orvosok **32**,
gyógyszerészek **32**, szakdolgozók **16** akkreditációs pontot kapnak.



1. Időbeosztás: az Ön által meglátogatni kívánt események listája
2. Szekciók, előadások: a rendezvény komplett, naprakész programja
3. Előadók: a rendezvény meghívott előadói és előadásaik helyszíne/időpontja
4. Absztraktok: az előadások és poszterek absztraktjai
5. A rendezvény támogatói (elérhetőségek, rövid bemutatkozás)
6. Térkép: a szekciók és egyéb programok helyszínei, valamint a kiállítás alaprajza
7. Kövesse az eseményeket a Facebook oldalán is!
8. Váltson üzenetet a résztvevőkkel, tegyen fel kérdéseket az előadókhoz az üzenőfalra!
9. Értésítés: helyszín vagy időpont változás? Különleges előadás téma?

Az értesítés egyenesen a mobil eszközre érkezik, hogy Ön ne maradjon le semmiről!



TUDOMÁNYOS PROGRAM

2026. FEBRUÁR 20., PÉNTEK

- | | |
|----------------------|--|
| 10:00 – 10:10 | Köszöntő
Prof. Dr. Szabó Zoltán
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnök

Prof. Dr. Lengyel Csaba
MDT elnöke, Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| 10:10 – 11:25 | DM klasszifikáció, dg, epidemiológia, kockázati tényezők |
| 10:10 – 10:35 | A diabetes mellitus epidemiológiája genetikája
Dr. Katona Éva
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika |
| 10:35 – 11:00 | A diabetes mellitus klasszifikációja és diagnosztikája
Dr. Balogh Zoltán
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika |
| 11:00 – 11:25 | Anyagcserezavarhoz társuló májbetegség és diabétesz: igazából szerelem
Dr. Fülöp Péter
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika |
| 11:25 – 11:40 | Szünet |

- 11:40 – 12:55** **DM mikrovaszkuláris szövődmények**
- 11:40 – 12:05** **A diabeteses neuropathia klinikai jelentősége**
Dr. Sztanek Ferenc
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 12:05 – 12:30** **Diabetes a nephrológus szemével**
Dr. Becs Gergely
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 12:30 – 12:55** **A diabetes szemészeti szövődményei és kezelésük**
Dr. Takács Lili
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika
- 12:55-14:25** **Ebédszünet**
- 14:25 – 15:40** **DM terápia I.**
- 14:25 – 14:50** **A metformin és a DPP4 gátló kezelés szerepe a 2-es típusú diabetes mellitus kezelésében**
Dr. Berta Eszter
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 14:50 – 15:15** **A betegséglefolyást módosító (DMD) terápiák jelentősége a 2-es típusú diabetes kezelésében**
Dr. Diószegi Ágnes
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 15:15 – 15:40** **Az inzulinkezelés 2-s típusú diabetes mellitusban**
Dr. Petró Gizella
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 15:40 – 15:55** **Szünet**

- 15:55 – 17:10** **DM terápia II.**
- 15:55 – 16:20** **Az inzulinkezelés deeszkálálása a mindennapi gyakorlatban**
Dr. Taybani Zoltán
Békés Vármegyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórház, 3. Belgyógyászat
- 16:20 – 16:45** **Az inzulinpumpa-kezelés elmélete és gyakorlata**
Dr. Káplár Miklós
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 16:45 – 17:10** **Az edukáció szerepe az 1-es és 2-es típusú diabetes mellitus hatékony gondozásában**
Dr. Molnár Ágnes
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
- 17:10 – 17:25** **Szünet**
- 17:25 – 17:50** **Az 1-es típusú diabetes szűrése és a korai intervenció lehetősége**
Prof. Dr. Barkai László
MDT főtitkára, Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, Élettani Szabályozások Kutatóközpont, Budapest
- 17:50 – 18:15** **Diabeteses krízisállapotok sürgősségi ellátása**
Dr. Somodi Sándor
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika
- 19:00 –** **Vacsora**

2026. FEBRUÁR 21., SZOMBAT**10:00 – 11:15** **DM terápia III.****10:00 – 10:25** **Atheroscleroticus szívérrendszeri betegség diabetes mellitusban és az antidiabeticum választás szempontjai****Dr. Homoródi Nóra**

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika

10:25 – 10:50 **Szívelégtelenség diabetes mellitusban és az antidiabeticum választás szempontjai****Dr. Nagy Gergely György**

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

10:50 – 11:15 **Az időskori törékenység, mint a cukorbeteg gondozás és kezelés fontos szempontja****Dr. Domboróczki Zsolt**

MDT Geriátriai munkacsoport vezetője, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Diabetes Gondozó

11:15 – 11:30 **Szünet****11:30 – 12:20** **Speciális kórképek****11:30 – 11:55** **Precíziós diabetológia****Dr. Gaál Zsolt**

CMC Déli Klinika, Budapest

11:55 – 12:20 **Lipodisztrófiák a szénhidrát anyagcsere eltérések hátterében****Prof. Dr. Harangi Mariann**

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika

12:20 – 12:40 **Tesztírás**

A TOVÁBBKÉPZÉSEN KIÁLLÍTÓ, HIRDETŐ, SZIMPÓZIUMTARTÓ CÉGEK



Lilly HungáriaKft.



Novo Nordisk Hungária Kft.



77 ELEKTRONIKA

77 Elektronika Kft.



Boehringer
Ingelheim

Boehringer Ingelheim RCV



AstraZeneca Kft.



ExCEED Orphan s.r.o.



RICHTER GEDEON
Richter Gedeon Nyrt.



Egis Gyógyszergyár Zrt.

AZ OZEMPIC® ÚJ KORSZAKA

- ✓ **Erőteljes glikémiás kontroll^{1-3*} és jelentős testsúlycsökkenés^{1*}**
- ✓ **CV és renális események kockázatának igazolt csökkenése^{1,4,5†}**
- ✓ **Bármely okból bekövetkező halálozás szignifikáns csökkenése^{5§}**



Az Ozempic® a diéta és a testmozgás kiegészítéseként, a nem megfelelően kontrollált T2DM-ben szenvedő felnőttek kezelésére javallott.¹

A képek nem valós betegeket ábrázolnak.

A GLP-1 RA, mely a T2DM betegek széles körének** nyújt igazolt előnyöket^{1,4,5}

* Az adatok az Ozempic® SUSTAIN vizsgálatokban elért eredményeire vonatkoznak, amelyekben placebo, szitagliptin, dulaglutid, exenatid ER, glargin inzulin, kanagliflozin és liraglutid is szerepelt komparátorként. SUSTAIN 4: A HbA_{1c} átlagos változása a 30. hétre (+MET ± SU), kiindulási érték 8,2% (N=1089); -1,2% Ozempic® 0,5 mg (n=362), (P<0,0001) és -1,6% Ozempic® 1 mg (n=360) mellett, (P<0,0001) vs. -0,8% a vizsgálati protokoll szerint titrált glargin inzulin (n=360). SUSTAIN 7: A HbA_{1c} átlagos változása a 40. hétre (+ MET), kiindulási érték 8,2% (N=1201); -1,5% Ozempic® 0,5 mg (n=301) vs. -1,1% dulaglutid 0,75 mg (n=299), (P<0,0001); -1,8% Ozempic® 1 mg (n=300) vs. -1,4% dulaglutid 1,5 mg (n=299), (P<0,0001). † Az eredmények a standard kezelés mellé adott 0,5 mg és 1 mg Ozempic® vs. a standard kezelés mellé adott placebo terápiára vonatkoznak olyan felnőtt T2DM betegek körében, akiknél diagnosztizált ASCVD állt fenn. ** Betegek, akiknél T2DM, T2DM + CVD és T2DM + CKD áll fenn. ‡ Az Ozempic® terápiás javallatai között nem szerepel a testsúlycsökkenés.¹ § Az előnyök a kardiovaszkuláris (CV) és renális események kockázatának igazolt csökkentését jelentik. CV=kardiovaszkuláris; GLP-1 RA=glükagon-szerű-peptid-1 receptor agonista; MET=metformin; SU=szulfonilurea; T2DM=2-es típusú cukorbetegség; ASCVD=ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegség; CKD=krónikus vesebetegség; CVD=kardiovaszkuláris betegség Referenciák: 1. Ozempic® alkalmazási előírás. 2. Lingvay I, Catarig AM, Frías JP, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, phase 3b, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(11):834-844. doi:10.1016/S2213-8587(19)30311-0. 3. Capehorn MS, Cata rig AM, Furburg JK, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs once-daily liraglutide 1.2 mg as add-on to 1-3 oral anti diabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). Diabetes Metab. 2020;46(2):100-109. doi:10.1016/j.diabet.2019.101117. 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al; SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(19):1834-1844. doi:10.1056/NEJMoa1607141. 5. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, Mahaffey KW, Mann JFE, Bakris G, et al; FLOW Trial Committees and Investigators. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2024 Jul 11;391(2):109-121. doi:10.1056/NEJMoa2403347.



A MAGYARORSZÁGON FORGALOMBAN LÉVŐ KÉSZÍTMÉNY NEVE, ÁRA, TÁMOGATÁSA ÉS RENDELHETŐSÉGE: Az Ozempic® oldatos injekció előretöltött injekciós tollban készítmények osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x1,5ml (EU/1/17 /1251/002), az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x1,5 ml (EU/1/17 /1251/003) és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x3 ml (EU/1/17 /1251/005) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 35 799 Ft, tb támogatás: 25 059 Ft, térítési díj: 10 740 Ft. EU. 70.1. pont szerinti rendelés esetén. Az ár-és támogatás adatokat az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertervezés alapján. BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, OLVASSA EL A GYÓGYSZER ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁT! <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ozempic/product-information-section> Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszereszközügyi Központ; Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu; elektronikus bejelentő form: <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/>; e-mail: ad.bbox@ogyei.gov.hu

Bizonyítottan csökkenti a kardiovaszkuláris események kockázatát a jelentős testsúlycsökkentésen túl^{1,4,5}

Átformáló fogyás

≥20%

fogyás 3-ból 1 betegnél,^{1,4}
átlagos testsúlycsökkenés
~17%*

Éveket ad az életnek†

20%

kockázatcsökkenés CV halál,
szívinfarktus és stroke összevont
végpontjában^{1,5‡}

Életet ad az éveknek



A fizikai teljesítőképesség
és az életminőség
javulása^{1-3,6,7}



A modellek nem valódi betegek vagy orvosok.

A Wegovy® a testtömeg kontrollálásához kiegészítő kezelésként szolgál a csökkentett kalóriatartalmú étrend és a fokozott fizikai aktivitás mellett, felnőttek és legalább 12 éves gyermekek és serdülők részére, az alkalmazási előírásban szereplő BMI és egyéb kritériumok teljesülése esetén.¹

2025. szeptemberétől Magyarországon is elérhető!

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól az alkalmazási előírás 4.8 pontjában kaphatnak további tájékoztatást.

* Átlagos kiindulási testtömeg: 105,6 kg a STEP 5 vizsgálatban Wegovy® injekciót használó páciensek esetén. Trial product estimand, azaz vizsgálati készítmény szerinti hatásbecslés (a kezelés várható hatása, amennyiben a vizsgálati készítményt az előírásoknak megfelelően adjagolják).⁴

† Összehalálózásra a kockázati arány 0,81 (95%-os CI 0,71-0,93), szuperioritásra nem tesztelték.[‡] A 3 pontos MACE vonatkozásában a kockázati arány 0,80 (95%-os CI 0,72-0,90), p<0,001 szuperioritásra. A SELECT vizsgálatba 45 év feletti, fennálló kardiovaszkuláris betegséggel és legalább 27 kg/m²-es BMI-vel rendelkező nem diabéteszes betegeket vontak be.⁵

1. Wegovy® alkalmazási előírás. 2. Kosiborod MN, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232. 6. Freedland KE. Improving quality of life in heart failure. Curr Cardiol Rep. 2021;23(11):159. 7. Patrick M, O'Neil, et al. (2022) Exploring the wider benefits of semaglutide treatment in obesity: insight from the STEP program, Postgraduate Medicine, 134:sup1, 28-36

A MAGYARORSZÁGON FORGALOMBAN LÉVŐ KÉSZÍTMÉNY NEVE, ÁRA, TÁMOGATÁSA ÉS RENDELHETŐSÉGE:

A Wegovy FlexTouch 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x1,5 ml (EU/1/21/1608/007) ill. a Wegovy FlexTouch 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x1,5 ml (EU/1/21/1608/007) ill. a Wegovy FlexTouch 1,7 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x3 ml (EU/1/21/1608/009) ill. a Wegovy FlexTouch 2,4 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 1x3 ml (EU/1/21/1608/010) készítmények osztályozási besorolása: „V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. Társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik.



A készítmény rendelése előtt kérjük, bővebb információért olvassa el a gyógyszer hatályos teljes alkalmazási előírását! <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/wegovy#product-information-section>

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszereseti Központ; Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu; elektronikus bejelentő űrlap: <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/>; e-mail: adr.box@ogyei.gov.hu.

A Wegovy® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegyei.

Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU25SEM00046 Lezárás dátuma: 2025-08-29